

Mucofalk O, (3,25 g/5g), granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 20 saszetek

Cena: 23,39 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 saszetek po 5 g
Postać	granulki
Producent	DR FALK PHARMA GMBH
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mucofalk O (Pomarańczowy) preparat oparty na naturalnym składniku – łupinach nasiennych babki jajowatej – który wspomaga pracę jelit i regulację trawienia. Lek pochodzenia roślinnego, przeznaczony do łagodzenia dolegliwości związanych z pracą układu pokarmowego. Dzięki pomarańczowemu smakowi stosowanie go jest nie tylko skuteczne, ale i przyjemne.

Wskazania

Mucofalk O stosuje się u dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat:

- w leczeniu nawykowych zaparć stolca;
- w stanach, w których pożądane jest ułatwienie opróżnienia jelit z miękkim stolcem, np. bolesne wypróżnienia po operacjach odbytu lub odbytnicy, przy szczelinach odbytu, chorobie hemoroidalnej;
- u pacjentów, u których pożądane jest przyjmowanie zwiększonej porcji błonnika pokarmowego, np. wspomagająco przy zaparciach będących objawem dominującym w zespole jelita drażliwego lub jako środek wspomagający dietę u pacjentów z hipercholesterolemią.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i osoby starsze: Leczenie nawykowych zaparć stolca oraz stany, w których pożądane jest ułatwienie opróżnienia jelit z miękkim stolcem, np. bolesne wypróżnienia po operacjach odbytu lub odbytnicy, przy szczelinach odbytu, chorobie hemoroidalnej: Jedna saszетка leku Mucofalk O (5 g granulat) zmieszanej z dużą ilością płynu, co najmniej 150 ml (1 g granulat popić co najmniej 30 ml płynu) 2 do 3 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest łupina nasenna babki jajowatej.

Każda saszetka (5 g granulatu) zawiera 3,25 g łupin nasiennych babki jajowatej.

- Substancje pomocnicze to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, dekstryna, alginian sodu, cytrynian sodu, chlorek sodu, sacharynian sodu, zapach pomarańczowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mucofalk O:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, czyli łupiny nasienne babki jajowatej lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta wystąpiły nagle zmiany zwyczajów dotyczących wypróżniania się, trwające ponad dwa tygodnie;
- jeśli u pacjenta wystąpiło niezdiagnozowane krwawienie z odbytu;
- jeśli u pacjenta po przyjęciu środków przeczyszczających nie nastąpiło wypróżnienie;
- jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego, w tym choroby przełyku i części wpustowej żołądka, niedrożność jelit (ileus) lub ryzyko jej wystąpienia, porażenie jelit lub rozszerzenie okrężnicy (megacolon);
- jeśli pacjent cierpi na trudności w przełykaniu lub inne zaburzenia w obrębie gardła i krtani.

Ostrzeżenia

- Mucofalk O zawiera 3,9 mmol (90 mg) sodu na dawkę (5 g), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
- Mucofalk O zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Uwaga dla chorych na cukrzycę: pojedyncza dawka leku Mucofalk O (5 g) zawiera 0,5 g sacharozy; wartość energetyczna: 3,07 kcal (12,86 kJ), co odpowiada 0,064 jednostkom chlebowym (tzw. wymiennik węglowodanowy).
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25 st.C.

Producent

DR FALK PHARMA
Świętokrzyska 36/16
Warszawa