

Mucofortin 600 mg, 10 tabletek musujących



Cena: 25,78 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MUCOFORTIN
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka musująca
Producent	NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mucofortin to lek w postaci tabletek musujących zawierający acetylocysteinę jako substancję czynną. Działa ona poprzez zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej, co ułatwia jej odkrztuszanie. Przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania u dorosłych w przypadku objawów zakażenia związanego z przeziębieniem, aby wspomóc rozrzedzenie wydzieliny dróg oddechowych i ułatwić jej odkrztuszanie.

Wskazania

Objawy zakażenia związane z przeziębieniem.

Działanie

Rozrzedzające wydzielinę i ułatwiające odkrztuszanie.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka na dobę.

Skład

1 tabletka musująca zawiera:

- substancję czynną: acetylocysteina 600 mg,
- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, izomalt, sodu wodorowęglan, kwas askorbowy, aspartam (E 951), aromat cytrynowy.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Mucofortin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w stanie astmatycznym (duszność w przebiegu astmy oskrzelowej lub obturacyjnej choroby płuc nieustępująca pomimo

stosowania leków rozkurczających oskrzela),

- jeśli pacjent ma fenyloketonurię,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat, gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób):

- skurcz oskrzeli, duszność, niestrawność.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna), krwotok.

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- obrzęk twarzy.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mucofortin należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- pacjent chorował lub choruje przewlekłe na astmę oskrzelową (gdyż lek może spowodować u niego skurcz oskrzeli i duszność),
- pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat),
- pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości niewydolność oddechową,
- pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- pacjent jest uczulony na histaminę, ponieważ Mucofortin może wywołać u niego objawy nietolerancji: ból głowy, zapalenie błony śluzowej nosa, świąd.

Producent

NATUR PRODUKT ZDROVIT