

Mucopect Control 375 mg, 30 kapsułek

Cena: 31,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MUCOPECT
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Mukolityczne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mucopect Control to lek w postaci kapsułek przeznaczony dla dorosłych, zawierający karbocysteinę, która należy do grupy mukolityków. Mechanizm działania karbocysteiny polega na zmniejszaniu lepkości flegmy, co ułatwia jej odkrztuszenie. Lek ten jest stosowany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego, które charakteryzują się nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Wskazania

Objawowe leczenie chorób układu oddechowego, którym towarzyszy nadmierne wydzielanie gęstego i lepkiego śluzu.

Działanie

Mukolityczne - zmniejsza lepkość wydzieliny tym samym ułatwiając jej odkrztuszenie.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): zwykle dawka początkowa wynosi 2 kapsułki przyjmowane 3 razy na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: karbocysteina 375 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana i magnezu stearynian, otoczka kapsułki: tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172) i żelatyna.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Wrzody w żołądku lub w jelicie.

Działania niepożądane

Należy przerwać przyjmowanie leku Mucopect Control i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do izby przyjęć w szpitalu, jeśli:

- Wystąpiła reakcja alergiczna. Może się objawiać: wysypką, trudnościami z przełykaniem lub oddychaniem, obrzękiem ust, twarzy, gardła lub języka.
- Na skórze pojawiły się krwawiące rany lub pęcherze, w tym w okolicach warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych. Mogą także występować objawy grypopodobne i gorączka. Może być to tak zwany „zespół Stevensa-Johnsona”.
- W wymiotach jest widoczna krew lub pacjent wydala czarne, smoliste stolce.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem Mucopectu Control należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, z chorobą wrzodową lub przyjmujących leki, które mogą wywoływać krwawienie w żołądku.
- W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.
- Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent
ADAMED

Galeria

