


Mucopect Kids 50 mg/ ml, syrop dla dzieci, 200 ml



Cena: 28,41 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MUCOPECT
Opakowanie	200 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Mukolityczne, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Mucopect Kids 50 mg/ml to syrop o bursztynowej barwie i słodkim, agrestowym smaku, przeznaczony do stosowania u dzieci od 6 roku życia.

Substancją czynną w tym leku jest karbocysteina, należąca do grupy leków zwanym mukolitykami, które są używane w leczeniu chorób układu oddechowego charakteryzujących się nadmiernym wydzielaniem śluzu w oskrzelach. Działa ona poprzez zmniejszanie lepkości śluzu, co ułatwia jego odkrztuszanie podczas kaszlu.

Wskazania

Syrop Mucopect Kids stosuje się w objawowym leczeniu chorób dróg oddechowych, przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Działanie

Zmniejszające lepkość śluzu i ułatwiające usuwanie go z dróg oddechowych podczas kaszlu.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę.

Skład

Substancja czynna jest karbocysteina (Carbocysteinum).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Mucopect Kids w przypadku:

- gdy pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- gdy pacjent ma wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy.

Działania niepożądane

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- nudności,
- wymioty,
- biegunka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- krwawienie z przewodu pokarmowego,
- zaburzenia żołądkowe,
- ból brzucha,
- reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, pokrzywka).

Częstość nieznaną:

- bóle głowy,
- pojedyncze przypadki pęcherzowego zapalenia skóry takie jak zespół Stevensa-Johnsona,
- u pacjentów nadwrażliwych może wystąpić zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i nosa.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować produktu przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.
- Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
- Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą i skurczem oskrzeli w wywiadzie, z przebytą chorobą wrzodową, z ostrą niewydolnością oddechową, z osłabionym odruchem kaszlu.
- Produkt zawiera sacharozę oraz metylu parahydroksybenzoatan.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące. Nie stosować tego leku, jeśli syrop zmienił barwę lub wykazuje jakiegokolwiek inne oznaki zepsucia.

Producent

ADAMED

Galeria

