

Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop, 200 ml



Cena: 53,92 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MUCOSOLVAN
Opakowanie	200 ml
Postać	Syrop
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Kaszel to istotny sygnał ostrzegawczy, świadczący o problemach w drogach oddechowych, a jednocześnie naturalny odruch pomagający je oczyścić. Niestety, powoduje on również dyskomfort fizyczny i psychiczny, ograniczając codzienną aktywność. W przypadku kaszlu mokrego warto działać w celu usunięcia zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych. Zaleca się stosowanie preparatów, które rozrzedzają wydzielinę, takich jak syrop Mucosolvan, wspomagający oczyszczanie i zapobiegający jej ponownemu gromadzeniu. Nie ukrywaj się przed kaszlem – podejmij działanie, aby się go skutecznie pozbyć!

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Działanie

Syrop Mucosolvan: ułatwia odkrztuszanie, oczyszcza drogi oddechowe, przywraca naturalną ochronę, łagodzi kaszel, rozrzedza wydzielinę, zmniejsza ból gardła i jego zaczerwienienie.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2x w ciągu doby 10 ml
- Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2-3x w ciągu doby 5 ml
- Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3x w ciągu doby 2,5 ml
- Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2x w ciągu doby 2,5 ml

Skład

- Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum).
- 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodoru.

- Substancje pomocnicze: sukraloza, kwas benzoesowy, hydroksyetyloceluloza, aromat owoców truskawkowych PHL-132200, aromat waniliowy PHL-114481, woda oczyszczona.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego:

- Często: zaburzenia smaku.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

- Często: niedoczulica gardła.

Zaburzenia układu immunologicznego:

- Rzadko: reakcje nadwrażliwości.
- Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd.

Zaburzenia żołądka i jelit:

- Często: nudności, niedoczulica jamy ustnej.
- Niezbyt często: biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty.
- Częstość nieznana: suchość w gardle.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- Rzadko: wysypka, pokrzywka.
- Częstość nieznana: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Ostrzeżenia

- W przypadku osób z ciężką niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności nerek przed zastosowaniem syropu należy skonsultować się z lekarzem.
- Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona (ang. Stevens Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.
- Ważny aż do roku od otwarcia, dla dorosłych i dzieci od 1 roku życia.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 6
01-211 Warszawa
CHC.kontakt@sanofi.com

Galeria

