

Mufluil Hipertonic, hipertoniczny roztwór do zakraplania i nebulizacji, 5 ml x 10 ampułek

Cena: 52,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ampułek po 5 ml
Postać	Roztwór
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Mukolityczne, Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Mufluil Hipertonic to roztwór soli fizjologicznej o stężeniu 0,3%, wzbogacony dodatkiem N-acetylocysteiny. Jest dostępny w postaci ampułek zawierających pojedynczą dawkę hipertonicznego roztworu soli NaCl. Produkt jest przeznaczony do leczenia chorób układu oddechowego, które charakteryzują się nadmierną produkcją gęstej i lepkiej wydzieliny.

Skład

1 ampułka roztworu (5 ml) zawiera:

- N-acetylocysteina 300 mg, chlorek sodu 150 mg.
- substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, wersenian sodu, woda do iniekcji.

Zastosowanie

Wskazany w terapii wziewnej zwłaszcza do łagodzenia objawów u pacjentów z nadmierną produkcją zalegającej wydzieliny, w tym w przebiegu:

- ostrego zapalenia oskrzeli
- przewlekłego zapalenia oskrzeli i jego powikłań,
- rozedmy płuc,
- mukowiscydozy,
- rozstrzenia oskrzeli,
- zapalenia zatok,
- wysiękowego zapalenia ucha.

Sposób użycia

Inhalacja

- Nebulizację zawartością ampułki przeprowadzać 1-2 razy dziennie przez 5-10 dni.
- Częstotliwość i dawki mogą być modyfikowane przez lekarza w szerokim zakresie, mając na uwadze efekt kliniczny i terapeutyczny, bez konieczności znacznego różnicowania dawek dla dorosłych i dla dzieci.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.
- W czasie ciąży i karmienia piersią Mufluil Hipertonic należy stosować tylko w razie bezwzględnej konieczności i pod bezpośrednim nadzorem lekarza.
- Nie należy podawać Mufluil Hipertonic w połączeniu z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ zmniejszenie odruchu kaszlu może prowadzić do gromadzenia się wydzieliny oskrzelowej.

Ostrzeżenia

- Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być ściśle monitorowani podczas leczenia.
- W przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać podawanie N-acetylocysteiny i zastosować odpowiednie leczenie.
- Przekroczenie zalecanej dawki Mufluil Hipertonic podawanej wziewnie i dotchawiczo-oskrzelowo może prowadzić do nadmiernego wydzielania upłynnionego śluzu, co u pacjentów z zahamowaniem odruchu kaszlu oraz zaburzonym odkrztuszaniem może powodować konieczność płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.
- Ze względu na wysokie stężenie soli w roztworze, stosowanie może powodować miejscowe objawy podrażnienia, które mogą skutkować skurczem oskrzeli, pieczeniem błony śluzowej nosa, wyciekami z nosa, nudnościami lub wymiotami.
- W przypadku wystąpienia takich efektów wskazane jest wywołanie odruchu kaszlu w dopuszczalnych granicach, ponieważ sprzyja to odkrztuszeniu i odblokowaniu dróg oddechowych.
- Skutki uboczne zwykle ustępują samoistnie po przerwaniu leczenia.
- Jeśli nie znikną, należy skonsultować się z lekarzem.
- Stosowanie się do zaleceń zawartych w ulotce zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- Stosowanie N-acetylocysteiny u pacjentów leczonych lekami na bazie nitrogliceryny może powodować obniżenie ciśnienia krwi z rozszerzeniem tętnicy skroniowej i możliwym wystąpieniem bólu głowy; przed zastosowaniem Mufluil Hipertonic należy skonsultować się z lekarzem oraz monitorować ciśnienie krwi.
- Mufluil Hipertonic może być podawany razem z lekami rozszerzającymi oskrzela, obkurczającymi naczynia krwionośne itp., ale w takim przypadku powinien być stosowany przez możliwie najkrótszy czas.
- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania antybiotyków z Mufluil Hipertonic.
- N-acetylocysteina zawarta w Mufluil Hipertonic może zaburzać test pomiaru salicylanów i ciał ketonowych w moczu.
- Zaleca się, aby przed zastosowaniem Mufluil Hipertonic poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowanych w ostatnim czasie innych lekach, w tym wydawanych bez recepty.

Ważne wskazówki

- Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Zaleca się otwarcie ampułki Mufluil Hipertonic tuż przed użyciem.
- Jeśli roztwór został zmieszany z innymi preparatami, należy go zużyć w jak najkrótszym czasie i nie przechowywać.
- Podczas otwierania ampułki Mufluil Hipertonic wydziela siarkowy zapach, który w żaden sposób nie wpływa na stosowanie preparatu.
- Roztwór może czasami zmienić kolor na różowy w otwartej ampułce lub pojemniku nebulizatora; nie wpływa to na aktywność i tolerancję preparatu.
- Data ważności wydrukowana na opakowaniu odnosi się do nieotwartego, prawidłowo przechowywanego opakowania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

Pharma Line S.r.l.
Via Agostino Bertani, 2
20154 Milano MI, Włochy