

# Multibiotic maść 1 sasz. a 1 g

Cena: 13,98 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sasz. po 1 g
Postać	Maść
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Przeznaczenie	Odmrożenia,, Oparzenie,, Otarcia,, Rana, Zadrapania
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Multibiotic** w postaci maści zawiera trzy antybiotyki: neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę, które posiadają właściwości przeciwbakteryjne. Lek przeznaczony jest do użytku w przypadku zarówno pierwotnych, jak i wtórnych zakażeń skórnych, takich jak niewielkie rany. Multibiotic może być stosowany u dzieci powyżej 12. roku życia oraz u dorosłych.

### Wskazania

Zapobieganie zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń. Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach), wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju *Pseudomonas*.

### Działanie

Przeciwbakteryjne.

### Dawkowanie

Nakładać maść 2 do 5 razy w ciągu doby w jednakowych odstępach czasu na chorobowo zmienione miejsca.

### Skład

1g maści zawiera: substancje czynne: siarczan neomycyny 5mg, bacytracyna cynkowa 10mg, siarczan polimyksyny B 0,833mg oraz substancje pomocnicze: propylu parahydroksybenzoesan (E216), metylu parahydroksybenzoesan (E218), wazelina biała.

### Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu:

- w nadwrażliwości na substancje czynne, aminoglikozydy, polimyksyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
- na błony śluzowe,
- na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia,

- na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry,
- do oczu,
- na sączące zmiany chorobowe,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- w ciąży i okresie karmienia piersią.

#### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Reakcje uczuleniowe, w tym skórne, z objawami takimi jak świąd, wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna.
- Podrażnienie w miejscu stosowania.
- Nadkażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami Candida.
- Uszkodzenie słuchu.

#### Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy przerwać w razie wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych jak wysypka, świąd, objawy podrażnienia i skontaktować się z lekarzem.
- Lek może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków o działaniu uszkadzającym nerki lub słuch, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
- Stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować uszkodzenie nerek i słuchu, łącznie z utratą słuchu, oraz wystąpienie objawów toksycznych ze strony układu nerwowego.
- Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub z upośledzeniem słuchu.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

CHEMA-ELEKTROMET  
Przemysłowa 9  
Rzeszów