

Nalgesin Mini 220 mg, 10 tabletek powlekanych



Cena: 9,83 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Nalgesin Mini 220 mg to lek w postaci powlekanych tabletek, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz przeciwgorączkowo. Jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia bólu o niewielkim i umiarkowanym nasileniu.

Wskazania

Lek Nalgesin Mini 220 mg 10 tabletek powlekanych stosuje się w leczeniu:

- ból głowy,
- ból zęba,
- bolesne miesiączkowanie,
- bóle stawowe,
- bóle mięśniowe.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Osoby dorosłe i młodzieży w wieku powyżej 16 lat z wagą powyżej 50 kg: 1 tabletkę, co 8-12 godzin. Alternatywnie, można przyjąć dwie tabletki od razu i w razie potrzeby jedną dodatkową tabletkę po 8-12 godzinach.
- Osoby w podeszłym wieku: maksymalna zalecana dawka dobową leku to 2 tabletki podzielone na dwie dawki. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.
- Pacjenci z niewydolnością nerek: maksymalna zalecana dawka dobową leku Nalgesin Mini to 2 tabletki podzielone na dwie dawki. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Nie wolno przyjmować leku przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek
- Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: maksymalna zalecana dawka dobową leku Nalgesin Mini to 2 tabletki podzielone na dwie dawki. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Nie wolno przyjmować leku Nalgesin Mini przez pacjentów z

ciężką niewydolnością wątroby.

Skład

1 tabletka Nalgesin Mini 220 mg 10 tabletek zawiera:

- substancję czynną: 220 mg naproksenu sodowego, co odpowiada 200 mg naproksenu,
- pozostałe składniki: w rdzeniu tabletki: powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian oraz w otoczce tabletki: opadry YS-1R-4215, E 132 o składzie: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 8000 i indygotyna (E 132), hypromeloza 6cp, makrogol 8000, candurin silver lustre o składzie: tytanu dwutlenek (E171), krzemian glinowo-potasowy (E 555).

Przeciwwskazania

Leku Nalgesin Mini 220 mg 10 tabletek nie należy przyjmować:

- jeśli pacjent jest uczulony na naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występowały trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa, polipy nosa lub poważne

reakcje alergiczne które powodują trudności w oddychaniu lub zawroty głowy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego oraz innych niesteroidowych

leków przeciwzapalnych (NLPZ),

- jeśli pacjent ma lub miał wrzód lub krwawienie w żołądku lub jelitach;
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego po zastosowaniu NLPZ;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
- podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży;
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienia.
- nie podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

- nudności, niestrawność, zgaga, wymioty, ból w żołądku, wzdęcia, ból brzucha, niepokój,
- bóle głowy, zawroty głowy, senność,

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

- reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk twarzy (obrzęk twarzy), obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy),
- zaburzenia snu, pobudzenie,
- dzwonienie w uszach (szumy uszne), zaburzenia słuchu,
- zaburzenia widzenia,
- siniaki,
- biegunka, zaparcia,
- wysypka skórna, świąd,
- zaburzenia czynności nerek,
- dreszcze,
- obrzęk kostek, stóp lub palców dłoni (obrzęk obwodowy).

Rzadko (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):

- krwawienie i (lub) perforacja w obrębie żołądka, wymioty z krwią pochodzącą z żołądka lub przełyku, krew w stolcu, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), nasilenie się stanu zapalnego, co powoduje ból brzucha i biegunkę (ostre zapalenie okrężnicy) nasilenie choroby Crohna,
- reakcje nadwrażliwości na światło, wypadanie włosów (łysienie), poważne choroby z pęcherzowym oddzieleniem się naskórka ust, oczu i narządów

płciowych (wysypki pęcherzykowo-pęcherzowe, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).Bardzo rzadko: (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób):

- zmiany morfologii krwi jak granulocytopenia, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna),
- objawy przypominające zapalenie opon mózgowych
- szybka akcja serca (tachykardia), obrzęk, podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), zastoinowa niewydolność serca,
- trudności w oddychaniu (duszność), astma,
- zapalenie jelita grubego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej),
- zażółcenie skóry i białkówek oczu wywołane problemami z wątrobą lub krwi (żółtaczka),
- zapalenie wątroby, zmiany aktywności enzymów wątrobowych (nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zapalenie żołądka (nieżyt żołądka).

Producent
KRKA