

Nalgesin Mini 220 mg, 20 tabletek

Cena: 15,73 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NALGESIN
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Przeznaczenie	Ból
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Nalgesin Mini 220 mg to lek przeznaczony do łagodzenia bólu i zmniejszania stanów zapalnych. Rekomendowany jest do stosowania u dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia.

Wskazania

Nalgesin Mini jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak: ból głowy, ból zęba, bolesne miesiączkowanie, bóle stawowe, bóle mięśniowe.

Działanie

Nalgesin Mini jest lekiem łagodzącym ból, zmniejszającym stan zapalny. Lek działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Działanie przeciwbólowe występuje szybko i utrzymuje się do 12 godzin.

Składniki

- Substancją czynną leku jest Naproksen sodowy. Każda tabletki zawiera 220 mg Naproxenu sodowego, co odpowiada 200 mg Naproksenu.
- Pozostałe składniki leku to: w rdzeniu tabletki: Powidon K 30, Celuloza mikrokryształiczna, Talk, Magnezu stearynian oraz w otoczce tabletki opadry YS-1R-4215, E 132 o składzie: Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 8000 i indygotyna (E 132), Hypromeloza 6cp, Makrogol 8000, Candurin silver lustre o składzie: Tytanu dwutlenek (E 171), Krzemian glinowo-potasowy (E 555)

Stosowanie

Zalecana dawka dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat z wagą powyżej 50 kg to 1 tabletki, co 8-12 godzin.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować leku:

- jeśli pacjent jest uczulony na naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występowały trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa, polipy nosa lub poważne

reakcje alergiczne które powodują trudności w oddychaniu lub zawroty głowy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

- jeśli pacjent ma lub miał wrzód lub krwawienie w żołądku lub jelitach
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego po zastosowaniu NLPZ
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca
- podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienia
- nie podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat

Działania niepożądane

- Często:

nudności, niestrawność, zgaga, wymioty, ból w żołądku, wzdęcia, ból brzucha, niepokój, bóle głowy, zawroty głowy, senność

- Niezbyt często:

reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk twarzy (obrzęk twarzy), obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy), zaburzenia snu, pobudzenie, dzwonienie w uszach (szumy uszne), zaburzenia słuchu, zaburzenia widzenia, siniaki, biegunka, zaparcia wysypka skórna, świąd, zaburzenia czynności nerek, dreszcze, obrzęk kostek, stóp lub palców dłoni (obrzęk obwodowy)

- Rzadko:

krwawienie i (lub) perforacja w obrębie żołądka, wymioty z krwią pochodzącą z żołądka lub przełyku, krew w stolcu, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), nasilenie się stanu zapalnego, co powoduje bóle brzucha i biegunkę (ostre zapalenie okrężnicy) nasilenie choroby Crohna, reakcje nadwrażliwości na światło, wypadanie włosów (łysienie), poważne choroby z pęcherzowym oddzieleniem się naskórka ust, oczu i narządów płciowych (wysypki pęcherzykowo-pęcherzowe, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

- Bardzo rzadko:

zmiany morfologii krwi jak granulocytopenia, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, objawy przypominające zapalenie opon mózgowych szybka akcja serca (tachykardia), obrzęk, podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), zastoinowa niewydolność serca, trudności w oddychaniu (duszność), astma, zapalenie jelita grubego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej), zażółcenie skóry i białek oczu wywołane problemami z wątrobą lub krwi (żółtaczką), zapalenie wątroby, zmiany aktywności enzymów wątrobowych (nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby)

Producent

KRKA