

# NAN AR Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania w przypadku ulewań 400 g



Cena: 72,22 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	400 g
Postać	prosz.
Producent	NESTLE POLSKA S.A.

## Opis produktu

### Wskazania

do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań

### Składniki

laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), skrobia ziemniaczana (21,6%), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, olej rybi, fosforan wapnia, chlorek magnezu, dwuwynian choliny, chlorek wapnia, olej z *Mortierella alpina*, L-arginina, chlorek sodu, witamina C (L-askorbinian sodu), L-histydyna, L-tyrozyna, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM17938\*), tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), L-karnityna, siarczan cynku, nukleotydy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferolu), niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), siarczan miedzi (II), witamina A (octan retinyli), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), siarczan manganu, jodek potasu, kwas foliowy, selenian (VI) sodu, witamina K (fitomenadion), witamina D (cholekalcyferol), D-biotyna, witamina B12 (cyjanokobalamina), \*zgodnie z licencją BioGaia

### Wartości odżywcze

	w 100 g proszku	w 100 ml gotowego produktu
Wartość energetyczna kJ	2151	281
Wartość energetyczna kcal	514	67
Tłuszcz, w tym: g	26	3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone g	6,3	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g	13,2	1,7
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g	4,7	0,6
- kwas linolowy mg	3900	509
- kwas α-linolenowy mg	340	44
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg	130	17

	w 100 g proszku	w 100 ml gotowego produktu
- ARA (kwas arachidonowy) mg	130	17
Węglowodany, w tym: g	59,9	7,8
- cukry, w tym: g	38,6	5
- laktoza g	38,6	5
- skrobia g	20,7	2,7
Błonnik g	≤0,5	≤0,07
Białko g	9,8	1,3
Sól g	0,49	0,06
Witaminy:		
Witamina A µg	500	65,2
Witamina D µg	12,8	1,7
Witamina E mg	10,5	1,4
Witamina K µg	35	4,6
Witamina C mg	77	10
Tiamina (B1) mg	0,45	0,06
Ryboflawina (B2) mg	0,48	0,06
Niacyna mg	3,5	0,46
Witamina B6 mg	0,26	0,03
Kwas foliowy µg	102	13,3
Witamina B12 µg	1,25	0,16
Biotyna µg	11,1	1,45
Kwas pantotenowy mg	2,5	0,33
Składniki mineralne:		
Sód mg	195	25,4
Potas mg	555	72,4
Chlor mg	384	50,1
Wapń mg	350	45,6
Fosfor mg	205	26,7
Magnez mg	51	6,7
Żelazo mg	5,3	0,69
Cynk mg	5	0,65
Miedź mg	0,4	0,05
Mangan mg	0,124	0,016
Fluor mg	≤0,514	≤0,067
Selen µg	30	3,9
Chrom µg	≤51,4	≤6,7
Molibden µg	≤71,9	≤9,38
Jod µg	110	14,3
Inne:		
Cholina mg	180	23,5
Inozytol mg	36	4,7
Tauryna mg	32	4,2
L-karnityna mg	15	2
Nukleotydy mg	15	2
Zawartość miarki: 4,35 g; 100 ml gotowego produktu = 13,05 g (3 miarki) + 90 ml wody.		

### Stosowanie

#### Sposób przygotowania

1. Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać produkt.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości produktu. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.
3. Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia.
4. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.
5. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.
6. Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie puszkę po każdym użyciu i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu (5-25°C). Zawartość zużyj w ciągu 3. tygodni po otwarciu opakowania.

#### Tabela karmienia

Wiek niemowlęcia 1. i 2. tydzień

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 90

Płaskie miarki **3**

Dzienna liczba karmień\*

NAN AR 6

Wiek niemowlęcia 3. i 4. tydzień

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 120

Płaskie miarki **4**

Dzienna liczba karmień\*

NAN AR 5

Wiek niemowlęcia 2. miesiąc

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 150

Płaskie miarki **5**

Dzienna liczba karmień\*

NAN AR 5

Wiek niemowlęcia 3. i 4. miesiąc

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 180

Płaskie miarki **6**

Dzienna liczba karmień\*

NAN AR 5

Wiek niemowlęcia 5. i 6. miesiąc

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 210

Płaskie miarki **7**

Dzienna liczba karmień\*

NAN AR 5

Wiek niemowlęcia 7.-9. miesiąc

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 210

Płaskie miarki **7**

Dzienna liczba karmień\*

NAN AR 4-3

Inne 1-2 \*

Wiek niemowlęcia od 10. miesiąca

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 210

Płaskie miarki **7**

Dzienna liczba karmień\*

NAN AR 3-2

Inne 2-3 \*

Opakowanie pozwala na przygotowanie około 30 porcji produktu o pojemności 100 ml, zgodnie z tabelą karmienia. Uwaga! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

\* Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C).

**Pamiętaj:** używaj wyłącznie załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku, niż wskazana, może prowadzić do



odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.  
**\* W tym wieku zgodnie ze schematem żywienia niemowląt dieta dziecka może być już bardziej urozmaicona. Skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem nowych posiłków.**

Ważna informacja: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować produkt, zasięgnij porady lekarza.

#### **Przechowywanie**

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.

#### **Przeciwwskazania**

**WAŻNE:** Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku.  
**UWAGA:** Zawsze przed przygotowaniem porcji produktu przegotuj wodę i wyparz butelkę. Pamiętaj, aby przygotować produkt zgodnie z instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję produktu, którą od razu podasz dziecku. **OSTRZEŻENIE:** Nieodpowiednie przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nie przechowuj resztek produktu - niezjedzoną porcję produktu należy od razu wylać. Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

**WAŻNE:** Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza. NAN AR jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia dla niemowląt od urodzenia do 12. miesiąca, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Zapytaj swojego lekarza o NAN AR.

Przeciwwskazania: alergia (lub podejrzenie alergii) na białka mleka krowiego.

#### **Producent**

Nestlé Polska S.A.

#### **Ważne**

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A. Vevey, Szwajcaria

#### **Zawartość opakowania**

400

#### **Opis**

NAN AR Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania w przypadku ulewań 400 g