

Naproxen Hasco 100 mg/ g, żel, 100 g

Cena: 27,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCO-LEK
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Żel Naproxen Hasco 100 mg/g to lek dostępny bez recepty (OTC), przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Jego główna substancja czynna, naproksen, wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dodatkowo, substancje pomocnicze jak lewomentol działają miejscowo znieczulająco i chłodząco, co może przynosić ulgę w miejscu aplikacji żelu. Wodzian chloralu, obecny jako składnik pomocniczy, również może delikatnie drażnić skórę i sprzyjać zwiększeniu miejscowego przepływu krwi, co wspomaga przenikanie naproksenu do obszarów skóry dotkniętych stanem chorobowym.

Wskazania

Do miejscowego stosowania w bólach mięśni i stawów:

- w przypadku urazów tkanek miękkich,
- w przypadku urazów stawów i ścięgien,
- w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Lek stosuje się miejscowo 4-5 razy na dobę. Żel należy aplikować na bolące miejsca, zachowując proporcję: każdy pasek leku o długości 1 cm przypada na powierzchnię skóry o wymiarach: 7 cm x 7 cm. Po zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: naproksen 100 mg,
- substancje pomocnicze: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, lewomentol, chlorału wodnian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. na kwas acetylosalicylowy).
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat oraz u kobiet w III trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia

- Ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwiobiegu należy zachować ostrożność u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną.
- Po zastosowaniu żelu na skórę należy dokładnie umyć ręce.
- Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się leku do oczu lub na błony śluzowe należy go usunąć poprzez obfite płukanie wodą.
- Nie stosować na stany zapalne skóry, na uszkodzoną skórę i otwarte rany.
- Podczas stosowania leku oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, w tym także solarium.

Dodatkowe informacje

Lek ten, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Po zastosowaniu leku mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne: nadwrażliwość, zaczerwienienie, podrażnienie, które zazwyczaj przemijają po odstawieniu leku.
- W przypadku długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane, które wynikają z ogólnego działania naproksenu (np. senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości, nudności, biegunka). Możliwe są reakcje uwrażliwienia na światło. Rzadko może wystąpić: pieczenie, świąd, rumień. W przypadku wystąpienia duszności lub zmian skórnych należy bezzwłocznie zakończyć stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław