

Nasic Aerozol do nosa 10 ml



Cena: 20,86 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NASIC
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Aerozol
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Katar, Uczulenie
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Nasic to aerozol do nosa, który skutecznie pomaga w łagodzeniu objawów niedrożności nosa, przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. Jego substancjami czynnymi są ksylometazolina oraz dekspantenol, które działają synergistycznie, przynosząc ulgę przy różnych problemach związanych z układem oddechowym.

Ksylometazolina, będąca sympatykomimetykiem, działa na receptory adrenergiczne, powodując zwężenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa. To zmniejsza przekrwienie, obrzęk i ułatwia oddychanie przez nos. Dzięki temu Nasic może być stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z przeziębieniem lub po przebytej operacji nosa, które często powodują niedrożność nosa i utrudniają oddychanie.

Wskazania

Jest wskazany w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa - dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Działanie

Przeciwobrzękowe, regenerujące.

Dawkowanie

Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat: po 1 dawce do każdego otworu nosowego, w razie konieczności do 3 razy na dobę.

Skład

1 dawka aerozolu (0,1 ml roztworu) zawiera:

- substancje czynne: ksylometazoliny chlorowodoru (Xylometazolini hydrochloridum) 0,1 mg, deksopantenolu (Dexpanthenolum) 5mg,
- substancje pomocnicze: benzalkoniowego chlorku roztwór, potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na chlorowodorek ksylometazoliny, deksopantenol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych znajdujących się w produkcie. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lub uczulenia na którykolwiek z tych składników, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
- Suchy nieżyt błony śluzowej nosa. Nasic zawiera ksylometazolinę, która jest skutecznym lekiem w łagodzeniu objawów niedrożności nosa, ale może nasilać objawy suchej błony śluzowej nosa. W przypadku występowania suchej błony śluzowej nosa, lek może być nieskuteczny lub pogorszyć stan, dlatego warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania.
- Po przeklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej. W takich przypadkach, stosowanie Nasic może być niewłaściwe lub wymagać specjalnej uwagi medycznej, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- U dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nasic nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6. roku życia, ponieważ odpowiednie dawkowanie i bezpieczeństwo stosowania nie zostały dostatecznie udokumentowane w tej grupie wiekowej. Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat, lekarz może zalecić inne odpowiednie leki lub metody łagodzenia objawów niedrożności nosa.

Działania niepożądane

- pobudzenie, bezsenność, zmęczenie
- kołatanie serca
- ból głowy, halucynacje

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

Lek Nasic zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

