

Nasic kids Aerozol do nosa 10 ml



Cena: 22,88 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NASIC
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Aerozol do nosa
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Regenerujące (odbudowujące), Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Nasic Kids (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkę, aerozol do nosa, roztwór to lek używany w leczeniu objawowym niedrożności nosa u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Nasic Kids zawiera dwie substancje aktywne: chlorowoderek ksylometazoliny, który powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, redukując tym samym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, oraz deksantanol, pochodną witaminy B5, która przyspiesza proces gojenia się ran i wspomaga odbudowę błon śluzowych.

Wskazania

Aerozol do nosa Nasic Kids stosuje się u dzieci od 2. do 6. roku życia w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych:

- w przebiegu przeziębienia,
- po przebytej operacji nosa,
- dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa.

Działanie

Pobudzanie procesu gojenia się błony śluzowej, poprawianie drożności nosa.

Dawkowanie

Zalecana dawka dla dzieci od 2 do 6 lat: 1 rozpylenie aerozolu do każdego otworu nosowego, raz lub dwa razy na dobę (co 8 - 10 godzin).

Skład

1 dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu = 0,10 g) zawiera:

- substancje czynne: chlorowoderek ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum) 0,05 mg, deksopantenol (Dexpanthenolum)

5,0 mg,

- substancje pomocnicze: benzalkoniowego chlorku roztwór (0,02 mg na aerozol), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny (Eur.Ph), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować aerozolu Nasic:

- jeśli mały pacjent jest uczulony na ksylometazoliny chlorowodorek, deksopantenol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Nasic;
- u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat;
- jeśli u dziecka występuje suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca);
- po zabiegach chirurgicznych usunięcia przysadki mózgowej przez nos (przezklinowe wycięcie przysadki) i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Działania niepożądane

Niezbyt często:

- reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk skóry i błon śluzowych, wysypka skórna, świąd).

Rzadko:

- kołatanie serca (palpitacje), przyspieszenie pracy serca (tachykardia),
- wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze).

Bardzo rzadko:

- pobudzenie, bezsenność, zmęczenie (np. senność, sedacja), ból głowy, halucynacje (szczególnie u dzieci),
- zaburzenia rytmu serca (arytmie serca),
- po ustaniu działania leku zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa, krwawienia z nosa,
- skurcze (szczególnie u dzieci).

Ostrzeżenia

- Spray do noska Nasic Kids zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący, dlatego nie powinien być stosowany przez dzieci ze stwierdzoną nadwrażliwością na tę substancję.
- Z powodu niebezpieczeństwa zaniku błony śluzowej nosa, stosowanie leku w przewlekłym zapaleniu śluzówki nosa powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.
- Należy unikać długotrwałego stosowania lub stosowania w dawkach większych niż zalecane, zwłaszcza u dzieci. Większe dawki powinny być podawane jedynie po konsultacji z lekarzem.
- Pacjenci z zespołem długiego odstępu QT leczeni ksylometazoliną mogą być w większym stopniu narażeni na ciężkie arytmie komorowe.
- Długotrwałe stosowanie i stosowanie w dawkach większych niż zalecane leków sympatykomimetycznych zmniejszających przekrwienie może prowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa.

Producent

M.C.M. KLOSTERFRAU

Galeria

