

Nasivin Sinex Aloe i Eukaliptus, 0,5mg/ml, aer. do nosa, 15 ml

Cena: 37,98 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerazol
Producent	P & G HEALTH GERMANY GMBH
Przeznaczenie	Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Nasivin Sinex Aloe i Eukaliptus to aerazol do nosa, który łagodzi objawy zatkanego nosa związane z przeziębieniem lub zapaleniem błony śluzowej nosa. Lek ten przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania u dzieci od 6. roku życia oraz u dorosłych.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Nasivin Sinex Aloe i Eukaliptus jest objawowe leczenie niedrożności nosa.

Działanie

Nasivin Sinex Aloe i Eukaliptus zawiera oksymetazolinę, która powoduje zwężenie naczyń w błonie śluzowej nosa, co skutkuje zmniejszeniem przekrwienia i udrożnieniem nosa.

Efekt działania leku pojawia się już po kilku minutach i utrzymuje się przez 12 godzin.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 1 dawka aerolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku poniżej 6 lat – nie stosować.

Skład

- Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksymetazoliny.
- Substancje pomocnicze: sorbitol (E 420); sodu cytrynian (do wyrównania pH) (E 331); polisorbat 80; alkohol benzylowy; kwas cytrynowy bezwodny (do wyrównania pH) (E 330); suchy wyciąg z aloesu; benzalkoniowy chlorek, roztwór; lewomentol; acesulfam potasowy (E 950); cyneol; L-Karwon; disodu edetynian; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjentów

stosujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub u pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni; pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów po przeklinowej hipofizektomii; zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa; pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca.

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): kichanie, suchość i podrażnienie w nosie, jamie ustnej lub gardle.
- Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): niepokój, zmęczenie, rozdrażnienie, zaburzenia snu, przyspieszony rytm serca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, zatłakany nos, obrzęk błony śluzowej nosa, ból głowy, nudności, rumieńce, wysypka i zaburzenia widzenia.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić z lekarzem, jeśli pacjent: ma wysokie ciśnienie krwi, ma chorobę serca, w tym dławicę piersiową, ma cukrzycę, ma zaburzoną czynność tarczycy, ma rozrost gruczołu krokowego.

Producent

P&G Health Austria GmbH & CO. OG
Hösslgasse 20
9800 Spittal/Drau, Austria

Galeria

