

Nasivin soft 0,025% 10 ml



Cena: 28,67 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NASIVIN
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerol do nosa
Producent	MERCK SELBSTMEDICATION GMBH
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos, Ułatwiający oddychanie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 1 dnia życia

Opis produktu

Wskazania

- Ostry nieżyt nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, alergiczny zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie trąbki słuchowej, w zapaleniu ucha środkowego.
- W diagnostyce w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej.
- Aerol do nosa może być stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia do 6 lat, w szczególności w celu łagodzenia objawów kataru i zatkanego nosa.

Działanie

- Zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamowanie nadmiernego wydzielanie, co umożliwia swobodne oddychanie przez nos.
- Obkurczenie błony śluzowej nosa prowadzące do otwarcia i rozszerzenia przewodów odprowadzających zatok przynosowych i oczyszczenia trąbki słuchowej, co ułatwia usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego.

Dawkowanie

Dzieci w wieku 1-6 lat: 1 dawka aerolu do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: oksymetazolinę chlorowodorek 0,25 mg (1 dawka aerolu o objętości 45 mikrolitra zawiera 11,25 mikrograma oksymetazolinę chlorowodorku),
- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

Działania niepożądane

- Do często występujących działań niepożądanych należą: pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.
- Niezbyt często zgłaszano: objawy ogólnoustrojowe, takie jak kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym (donosowym) stosowaniu leku.
- Rzadko odnotowuje się: ból głowy, bezsenność lub zmęczenie

Ostrzeżenia

- Pacjenci leczeni inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi, mający zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania, ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), guz chromochłonny nadnerczy, zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca) powinni stosować lek wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.
- Długotrwałe stosowanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może prowadzić do osłabienia ich działania.
- Nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa.
- Zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej

Producent

P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy