

Nasivin soft 0,05% 10 ml



Cena: 28,67 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NASIVIN
Opakowanie	10 ml
Postać	Aeroszol
Producent	MERCK SELBSTMEDICATION GMBH
Przeznaczenie	Katar, Zatoki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Nasivin Classic jest skutecznym lekiem w postaci sprayu do nosa, który pomaga przywrócić swobodne oddychanie podczas kataru i innych stanów zapalnych błony śluzowej nosa. Substancją czynną tego produktu leczniczego jest chlorowodorek oksymetazoliny, który działa zwężająco na naczynia krwionośne, co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Dzięki temu zmniejsza się ilość wydzieliny śluzowej, co ułatwia oddychanie przez nos.

Nasivin Classic nie tylko zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, ale także wpływa pozytywnie na zatoki przynosowe. Po zastosowaniu sprayu, przewody odprowadzające zatok przynosowych się rozszerzają i otwierają, co pomaga w odblokowaniu trąbek słuchowych.

Wskazania

- obrzęku błon śluzowej nosa występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- naczyniowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- naczyniowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- zapaleniu zatok przynosowych,

Działanie

- Substancja czynna leku, jaką jest oksymetazoliny chlorowodorek zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanej wydzieliny.
- Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe.



Dawkowanie

Dorośli i dzieci wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu Nasivin® Classic do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg (1 dawka aerozolu o objętości 45 mikrolitra zawiera 22,5 mikrograma oksymetazoliny chlorowodoru),
- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

Działania niepożądane

pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może prowadzić do osłabienia ich działania.
- Nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa.
- Zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.