

Natussic, (7,5 mg/5 ml), syrop, 200 ml

Cena: 34,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 butelka po 200 ml
Postać	Syrop
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Natussic to lek przeciwkaszlowy stosowany w leczeniu objawowym kaszlu różnego pochodzenia. Dostępny w formie syropu o charakterystycznym smaku i zapachu wanilii.

Wskazania

Leczenie objawowe ostrego i nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Działanie

Natussic zawiera substancję czynną o działaniu przeciwkaszlowym, która łagodzi kaszel różnego pochodzenia. Lek nie wykazuje przyzwyczajania ani uzależnienia.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- Dorośli: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian (Butamirati citras).
- Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący; glicerol; sacharyna sodowa (E 954); sodu wodorotlenek; wanilina; kwas benzoesowy (E 210); etanol 96% (v/v); woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego Natussic, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych



składników tego leku.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób): senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Butamirat cytrynian hamuje odruch kaszlu, dlatego należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych.
- Lek zawiera w swoim składzie małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
- Lek zawiera w swoim składzie sorbitol - nie stosować w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław