

Nefrobonisol, płyn doustny, 100 g

Cena: 36,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BONIMED
Opakowanie	100 g
Postać	Płyn
Producent	LABORATORIUM MEDYCyny NATURALNEJ BONIMED
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Moczopędne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Roślinny preparat leczniczy przeznaczony do tradycyjnego stosowania w podanych wskazaniach: pomocniczo w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych oraz przy piasku nerkowym. Jego skuteczność wynika wyłącznie z długotrwałego stosowania i doświadczenia.

Wskazania

Pomocniczo w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych oraz w piasku nerkowym.

Działanie

Preparat o działaniu moczopędnym.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 12 lat: 1-3 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (w kieliszku wody rozcieńczyć ok. 1 małej łyżeczki preparatu).
- Dzieci poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania.

Skład

100 g preparatu zawiera:

- 20 g nalewki z ziela nawłoci pospolitej, 20 g nalewki z ziela skrzypu, 20 g soku z liścia brzozy, 15 g soku z ziela pokrzywy, 15 g soku z korzenia mniszka, 10 g soku z ziela krwawnika.
- Preparat zawiera etanol.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na rośliny z rodziny astrowatych.
- Nie zaleca się stosowania leku przy obrzękach spowodowanych niewydolnością serca lub nerek.

Ostrzeżenia

- Preparat zawiera do 55% (V/V) etanolu (alkoholu), czyli do 1,11 g w jednej dawce (2,5 ml), co odpowiada 28 ml piwa (5 % obj.) lub 11,5 ml wina (12 % obj.) na dawkę. Zastosowanie leku jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, jak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.
- Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży, w okresie karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.
- Jeśli wystąpią takie objawy jak gorączka, bolesne oddawanie moczu, skurcze lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeśli objawy choroby podczas stosowania preparatu utrzymują się dłużej niż 1 tydzień, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syntetycznych leków moczopędnych bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

BONIMED