

Neo-Angin, 1,2 mg+0,6 mg+5,9 mg, tabletki do ssania, 24 tabletki

Cena: 27,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEO-ANGIN
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletek
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwgrzybicze, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Neo-Angin to produkt leczniczy do stosowania w stanach zapalnych gardła, jamy ustnej, które przebiegają z obrzękiem, bólem czy zaczerwienieniem.

Wskazania

Leczenie wspomagające w przypadku stanów zapalnych gardła i jamy ustnej z towarzyszącym bólem, zaczerwienieniem i obrzękiem.

Działanie

Neo-Angin wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze (dzięki obecności alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i amylometakrezolu). Lewomentol "chłodzi" miejscowo błony śluzowe i słabo znieczula błony śluzowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1 tabletki co 2-3 godziny. Nie więcej niż 6 pastylek na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy (Alcohol 2,4-dichlorobenzyllicus), amylometakrezol (Amylmetacresolum), lewomentol (Levomentholum).
- 1 tabletki do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezol i 5,9 mg lewomentolu.
- Substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiazdzistego, olejek miętowy, sacharoza, syrop glukozowy, kwas winowy, czerwien koszenilowa A (E 124).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Neo-Angin:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nietolerancji fruktozy,
- u dzieci poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego,
- reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia

- Osoby chore na cukrzycę powinny wziąć pod uwagę zawartość glukozy i sacharozy w tabletkach tj. 1,14 g glukozy i 1,42 g sacharozy.
- Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.
- Jeśli objawy związane ze stanem zapalnym utrzymują się lub pojawią się nowe objawy jak kaszel czy gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

DIVAPHARMA GMBH

Galeria

