

Neo-angin Tabletki do ssania bez cukru 24 sztuki

Cena: 29,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEO-ANGIN
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki do ssania
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Łagodzące (kojące), Regenerujące (odbudowujące)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Neo-angin Bez Cukru 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg to lek w postaci tabletek do ssania, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Ból gardła, często związany z obecnością wirusów i bakterii, jest powszechnym objawem infekcji i stanów zapalnych, zwłaszcza w przypadku przeziębienia. Produkt leczniczy zawiera dwie substancje czynne: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol, które działają antyseptycznie, oraz lewomentol, wywołujący uczucie chłodu na błonach śluzowych gardła.

Wskazania

Ból gardła wywołany przez infekcje oraz stany zapalne w jamie ustnej i gardle powstające podczas przeziębienia.

Działanie

Amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i lewomentol, tworzą formułę TriActive, która działa na trzy sposoby:

- uwalnia od bólu gardła,
- zwalcza infekcję gardła,
- wspomaga leczenie stanu zapalnego.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1 tabletki co 2-3 godziny.

Skład

1 tabletki bez cukru zawiera:

- substancje czynne: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 1,2 mg, amylometakrezol 0,6 mg i lewomentol 5,72 mg,
- pozostałe składniki leku to: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, izomalt, kwas winowy, czerwień koszenilowa A (E 124).

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zastosowania Neo-angin bez cukru jest uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie stosować u osób z nietolerancją fruktozy oraz dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko obserwowano: podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, jak gorączka i kaszel lub utrzymywania się bólu gardła należy skonsultować się z lekarzem.
- 1 tabletkę do ssania zawiera 2,58 g izomaltu (substancja słodząca), więc pacjenci z cukrzycą powinni zwrócić na to uwagę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa

Galeria

