

Neo-Pancreatinum Forte 20 kapsułki

Cena: 24,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	
Opakowanie	20 kapsułki
Postać	Kapsułki
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Niestrawność, Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Neo-Pancreatinum forte to lek dostępny w postaci kapsułek dojelitowych, które zawierają pankreatynę. Pankreatyna to zespół enzymów trawiennych pochodzenia trzustkowego, które pomagają w trawieniu białek, cukrów i tłuszczów w organizmie.

Co ważne, kapsułki są odporne na działanie kwasu żołądkowego, co oznacza, że pankreatyna uwalnia się dopiero w jelitach. To pozwala na skuteczniejsze trawienie, ponieważ enzymy trawienne działają w miejscu, gdzie przetwarzanie pokarmu jest najważniejsze.

Wskazania

Niedobory enzymów trzustkowych.

Działanie

Neo-Pancreatinum Forte uzupełnia lub zastępuje działanie enzymów trawiennych, umożliwiając lepsze przyswojenie składników odżywczych z pożywienia.

Dawkowanie

Dorośli: od 2 do 4 kapsułek z każdym posiłkiem. Dzieci: dawka dla dzieci powinna być zawsze ustalona przez lekarza.

Skład

1 kapsułka zawiera: substancję czynną: pankreatynę w postaci peletek pokrytych otoczką dojelitową. Pankreatyna w każdej kapsułce wykazuje następującą aktywność enzymatyczną: lipazy 10000j.Ph.Eur., amylazy 8000 j.Ph.Eur., proteaz 500j.Ph.Eur. j.Ph.Eur. jest to jednostka aktywności enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej. Inne składniki leku to: peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; otoczką kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172); otoczką kapsułki część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), lak aluminiowy żółtocien chinolinowej (E104).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Neo-Pancreatinum Forte:



- w razie nadwrażliwości na pankreatynę, inne składniki preparatu, białko wieprzowe,
- w ostrym zapaleniu trzustki,
- w pogarszaniu przewlekłego zapalenie trzustki.

Działania niepożądane

- Wysypka, kichanie, łzawienie.
- Biegunka, nudności, wymioty.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy zachować ostrożność jeśli lek podawany jest dzieciom z mukowiscydozą przyjmującym duże dawki enzymów, ponieważ w rzadkich przypadkach zanotowano u tych dzieci zwężenie jelita.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.