

Neocate Junior 1+, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku neutralnym, 400 g



Cena: 114,85 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	400 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Neocate Junior 1+ to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o neutralnym smaku, przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku życia z alergią na białka mleka krowiego, złożoną nietolerancją białek pokarmowych oraz innymi schorzeniami, które wymagają diety elementarnej. Produkt w formie proszku jest hipoalergiczny, oparty na aminokwasach i zapewnia pełne odżywienie.

Skład

Suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (średniołańcuchowe triglicerydy (olej ziaren palmowych i/lub olej kokosowy), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), L-seryna, L-glutamina, maltodekstryna, glicyna, L-alanina, L-leucyna, octan L-lizyny, L-treonina, cytrynian potasu, L-tyrozyna, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), L-walina, L-izoleucyna, wodorofosforan wapnia, chlorek magnezu, L-prolina, wodorofosforan sodu, węglan wapnia, L-cystyna, L-histydyna, L-fenylalanina, wodorofosforan dipotasu, L-metionina, L-arginina, chlorek sodu, diwinian choliny, L-tryptofan, cytrynian wapnia, kwas L-askorbinowy, chlorek wapnia, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, palmitynian L-askorbylu), tauryna, inozytol, siarczan żelaza(II), L-karnityna, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi(II), ryboflawina, siarczan manganu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, jodek potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, chlorek chromu(III), selenian(IV) sodu, fitomenadion, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Przeznaczenie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku neutralnym do postępowania dietetycznego u dzieci po 1. roku życia, w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Sposób użycia

Zawsze przygotuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie musi być określona wyłącznie przez lekarza i zależy od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta! Przed przygotowaniem pokarmu zapoznaj się z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji przygotowania i



przechowywania pokarmu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Umyj starannie ręce i miejsce przygotowania posiłku. Smoczek i butelkę wysterylizuj w sterylizatorze parowym, lub wygotuj w świeżej, pitnej wodzie przez 10 minut. Gotuj świeżą wodę pitną przez co najmniej 5 minut i pozostaw do wystygnięcia. Woda powinna być ciepła po sprawdzeniu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni. Wlej wymaganą ilość wody do wysterylizowanej butelki lub kubka. Napełnij miarkę załączoną do opakowania, nadmiar proszku usuń czystym, suchym nożem. Nie ubijaj proszku w miarce. Używaj tylko miarki załączonej do opakowania. Dodaj zaleconą ilość miarek proszku do wody. Wymieszaj, aż proszek się rozpuści. Przed podaniem sprawdź temperaturę pokarmu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni. Niewykorzystaną porcję pokarmu, która pozostała w butelce po karmieniu należy wyrzucić po godzinie od przygotowania. Nie wolno podgrzewać posiłku podczas karmienia. Produkt, który pozostał w butelce, należy wykorzystać najpóźniej godzinę po przygotowaniu lub wyrzucić. Nie wolno ponownie odgrzewać pozostałej porcji. Jeżeli przygotowana porcja nie jest przeznaczona do spożycia w ciągu 1 godziny od przygotowania, należy ją szybko i bezpośrednio po przygotowaniu schłodzić i przechowywać w lodówce nie dłużej, niż 24 godziny.

Zalecane dzienne spożycie

Zalecane spożycie 21,1% w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na każde 30 ml wody. 1 płaska miarka = 7,3 g proszku.

Przeciwwskazania

Nie stosować u niemowląt poniżej 1 roku życia. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego należy zawsze stosować po konsultacji i pod nadzorem lekarza. Całkowite lub częściowe zastąpienie mleka matki w karmieniu niemowląt innymi preparatami odżywczymi powinno być poprzedzone konsultacją lekarską. Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie przechowywać puszek z proszkiem w lodówce. Zużyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia puszek. Zamknięte fabrycznie puszki należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie należy zamrażać porcji posiłku. Nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej. Istotne jest, aby przestrzegać wytycznych na etykiecie dotyczących stosowania i przechowywania produktu. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia lub jako uzupełnienie diety.

Producent

SHS INTERNATIONAL
White Horse Business Park, Newmarket Avenue
Trowbridge, Wiltshire, Wielka Brytania