

Neocate Syneo, proszek ,0 m+, 400 g



Cena: 158,62 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	400 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka, Od 1 dnia życia

Opis produktu

Opis

Neocate Syneo, proszek 0 m+ – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i dzieci z alergią na białka mleka krowiego, złożoną nietolerancją białek pokarmowych oraz innymi schorzeniami wymagającymi diety elementarnej. Hypoalergiczny produkt w formie proszku, oparty na aminokwasach i w pełni odżywczo kompletny.

Dawkowanie

- Wiek niemowlęcia/dziecka: po urodzeniu.

Przybliżona masa ciała: 3,5 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 3.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 90 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 6-7.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: 2 tygodnie.

Przybliżona masa ciała: 4 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 4.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 120 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 6.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: 2 miesiące.

Przybliżona masa ciała: 5,5 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 5.

Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 150 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 5-6.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: 3 miesiące.

Przybliżona masa ciała: 6 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 6.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 180 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 5.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: 5 miesięcy.

Przybliżona masa ciała: 7,5 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 7.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 210 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 4-5.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: 7 miesięcy.

Przybliżona masa ciała: 8,5 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 7.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 210 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 4.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: 10 miesięcy.

Przybliżona masa ciała: 9 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 8.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 240 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 4.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: 11-12 miesięcy.

Przybliżona masa ciała: 9,5 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 8.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 240 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 3-4.

- Wiek niemowlęcia/dziecka: >12 miesięcy.

Przybliżona masa ciała: ≥ 10 kg.
Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo: 8.
Objętość przegotowanej, ostudzonej wody: 240 ml.
Ilość posiłków w ciągu doby: 2-3.

Skład

Składniki: Suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (średniołańcuchowe triglicerydy (olej kokosowy i/lub olej palmowy), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), błonnik pokarmowy (oligofruktoza (sc-FOS), inulina (lc-FOS)), L-asparaginian L-argininy, L-leucyna, octan L-lizyny, L-glutamina, L-prolina, L-walina, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), L-izoleucyna, glicyna, L-treonina, wodorofosforan dipotasu, L-feniloalanina, L-tyrozyna, L-seryna, L-histydyna, L-alanina, wodorofosforan wapnia, cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, diwinian choline, L-cystyna, glicerofosforan wapnia, L-tryptofan, cytrynian wapnia, chlorek magnezu, L-metionina, olej z *Cryptocodinium cohnii*, fosforan wapnia, olej z *Mortierella alpina*, L-asparaginian magnezu, inozytol, kwas L-askorbinowy, przeciwutleniacze (lecycyny



(lecytyna słonecznikowa), palmitynian L-askorbylu), tauryna, Bifidobacterium breve M-16V, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, L-karnityna, octan DL-alfa-tokoferylu, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, nikotynamid, D-pantotnian wapnia, sól sodowa 5'-monofosforanu inozy, 5'-monofosforan adenozy, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozy, siarczan miedzi(II), monoazotan tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, jodek potasu, siarczan manganu, kwas pteroilomonoglutaminowy, fitomenadion, selenian(IV)sodu, chlorek chromu(III), molibdenian(VI) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Bifidobacterium breve M-16V 1 x 10¹⁰ CFU/100g.

Przeznaczenie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku neutralnym do postępowania dietetycznego u niemowląt i dzieci, w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Sposób użycia

Zawsze przygotowuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie musi być określona wyłącznie przez lekarza i zależy od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta! Przed przygotowaniem pokarmu zapoznaj się z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji przygotowania i przechowywania pokarmu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Umyj starannie ręce i miejsce przygotowania posiłku. Smoczek i butelkę wysterylizuj w sterylizatorze parowym, lub wygotuj w świeżej, pitnej wodzie przez 10 minut. Gotuj świeżą wodę pitną przez co najmniej 5 minut i pozostaw do wystygnięcia. Woda powinna być ciepła po sprawdzeniu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni. Wlej wymaganą ilość wody do wysterylizowanej butelki lub kubka. Napełnij miarkę załączoną do opakowania, nadmiar proszku usuń czystym, suchym nożem. Nie ubijaj proszku w miarce. Używaj tylko miarki załączonej do opakowania. Dodaj zaleconą ilość miarek proszku do wody. Wymieszaj, aż proszek się rozpuści. Przed podaniem sprawdź temperaturę pokarmu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni. Niewykorzystaną porcję pokarmu, która pozostała w butelce po karmieniu należy wyrzucić po godzinie od przygotowania. Nie wolno podgrzewać posiłku podczas karmienia. Produkt, który pozostał w butelce, należy wykorzystać najpóźniej godzinę po przygotowaniu lub wyrzucić. Nie wolno ponownie odgrzewać pozostałej porcji. Jeżeli przygotowana porcja nie jest przeznaczona do spożycia w ciągu 1 godziny od przygotowania, należy ją szybko i bezpośrednio po przygotowaniu schłodzić i przechowywać w lodówce nie dłużej, niż 24 godziny.

Ostrzeżenia

Przeznaczony dla niemowląt od urodzenia. Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego należy zawsze stosować po konsultacji i pod nadzorem lekarza. Całkowite lub częściowe zastąpienie mleka matki w karmieniu niemowląt innymi preparatami odżywczymi powinno być poprzedzone konsultacją lekarską. Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie przechowywać puszek z proszkiem w lodówce. Zużyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia puszek. Zamknięte fabrycznie puszek należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie należy zamrażać porcji posiłku. Nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej. Istotne jest, aby przestrzegać wytycznych na etykiecie dotyczących stosowania i przechowywania produktu. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło żywienia lub jako uzupełnienie diety.

Producent

SHS INTERNATIONAL
White Horse Business Park, Newmarket Avenue
Trowbridge, Wiltshire, Wielka Brytania