

NeoFuragina, 50 mg, tabletki, 30 tabletek

Cena: 28,28 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEOFURAGINA
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Infekcja, Zakażenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

NeoFuragina to lek przeznaczony do leczenia bakteryjnych zakażeń dróg moczowych. Działa przeciwbakteryjnie dzięki zawartości furazydyny, która hamuje rozwój bakterii.

Wskazania

NeoFuragina wskazana jest do leczenia zakażeń dolnych dróg moczowych.

Działanie

NeoFuragina zawiera furazydynę (pochodną nitrofuranu) o działaniu przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum działania. Furazydyna wykazuje silniejsze działanie w środowisku kwaśnym, słabsze w zasadowym.

Dawkowanie

W pierwszym dniu stosuje się 2 tabletki 4 razy na dobę; kolejno 2 tabletki 3 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest: furazydyna (Furazidinum).
- 1 tabletka zawiera 50 mg furazydyny.
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku NeoFuragina:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek ze składników tego leku,
- u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży,

- w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
- u dzieci i młodzieży,
- jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy),
- jeśli u pacjenta występuje polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub czuciowymi),
- jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach) ze względu na ryzyko wystąpienia hemolizy w przypadku doustnego przyjmowania leku.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- nudności, nadmierne oddawanie gazów,
- bóle głowy.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczyniowo-ruchowy (choroba skóry tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków),
- ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona -pęcherzowy rumień wielopostaciowy),
- objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).

Częstość nieznana:

- świąd, pokrzywka, wysypka,
- zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia,
- uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,

niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B),

- reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą-reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego, w tym: reakcje ostre - objawiające się gorączką dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością - najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku,
- bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki,
- łysienie (przemijające),
- zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie,
- sinica wskutek methemoglobinemii.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia uczucia mrowienia, drętwienia, gorączki, dreszczy, bólu w klatce piersiowej, duszności należy skonsultować się z lekarzem i odstawić lek.
- W przypadku długotrwałego stosowania należy regularnie badać krew, czynność wątroby i nerek.
- Podczas leczenia furazydyną należy unikać spożycia alkoholu.
- NeoFuragina zawiera laktozę i sacharozę.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa

Galeria

