

Neosine, 500 mg, tabletki, 20 tabletek

Cena: 30,33 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEOSINE
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Uodparniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Neosine to lek o działaniu przeciwwirusowym, który wspomaga także wzmacnianie odporności organizmu.

Wskazania

Neosine stosuje się wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Działanie

Neosine działa przeciwwirusowo i zwiększa odporność organizmu poprzez pobudzenie czynności układu odpornościowego.

Dawkowanie

- Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 2 tabletki 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia: zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana na kilku dawkach podzielonych.

Skład

- Substancją czynną leku jest inozyna pranobeks (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.
- 1 tabletki zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.
- Substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Neosine:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi.
- nudności lub wymioty,
- ból brzucha,
- swędzenia wysypka skórna,
- ból głowy lub zawroty głowy,
- zmęczenie, złe samopoczucie,
- bóle stawów.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

- biegunka,
- zaparcia,
- nerwowość,
- senność lub trudności w zasypianiu,
- wydalanie dużej ilości moczu.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego, jeśli pacjent miał kamice nerkową, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.
- Lek zawiera skrobię pszeniczną, leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż celiakia).
- Lek Neosine mogą stosować pacjenci z celiakią.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Galeria

