

Neosine Forte 1000 mg Lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność, 10 tabletek

Cena: 25,79 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEOSINE
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odporność, Opryszczka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Neosine Forte 1000 mg to lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność. Jest zalecany do stosowania wspomagająco u osób o obniżonej odporności, szczególnie w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Wskazania

Wskazania do stosowania leku Neosine:

- wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex)

Działanie

Neosine forte jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego). Lek Neosine forte zawiera substancję czynną - inozyliny pranobeks, która hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Składniki

- Substancją czynną leku jest Inozyliny pranobeks (Kompleks zawierający Inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletkę zawiera 1000 mg inozyliny pranobeksu.
- Pozostałe składniki to: Skrobia pszeniczna, Mannitol, Powidon 30, Magnezu stearynian.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

- Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1000 mg, tj. 1 tabletka 3 razy na dobę.
- Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku

- Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.
- Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine forte w syropie.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Neosine forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Działania niepożądane

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi
- nudności z wymiotami lub bez
- ból brzucha
- świąd, wysypka skórna
- ból głowy lub zawroty głowy
- zmęczenie, złe samopoczucie
- bóle stawów

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

- biegunka
- zaparcia
- nerwowość
- senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność)
- wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz)

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neosine forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu
- jeśli pacjent miał kamicę nerkową
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku Neosine lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek
- jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek i wątroby

Producent

AFLOFARM

Galeria

