

Nicorette Classic Gum, 4 mg, guma do żucia, 105 sztuk



Cena: 133,28 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NICORETTE
Opakowanie	105 sztuk
Postać	guma do żucia
Producent	MCNEIL AB
Przeznaczenie	Rzucanie palenia
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lecznicza guma **Nicorette** jest zalecana w terapii uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdeterminowanych do rzucenia palenia. Pomaga zmniejszyć głód nikotynowy oraz łagodzi objawy odstawienne po zaprzestaniu palenia.

Wskazania

Uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu

Działanie

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają się pojawiać różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy Nicorette można im zapobiec lub je osłabić dostarczając do organizmu w krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę.

Skład

- Jedna kostka gumy Nicorette zawiera 4 mg nikotyny w postaci 20 mg kompleksu żywicy nikotynowej 20%
- Substancje pomocnicze: bezwodny węglan sodu, guma bazowa, sorbitol proszek, aromat smakowy ZD-49284, aromat smakowy 83.6422, gliceryna 85%, zółcień chinolowa.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować gumy leczniczej Nicorette:

- w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na składniki preparatu.



Działania niepożądane

Większość objawów niepożądanych występuje w ciągu pierwszych 3-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Podczas pierwszych dni stosowania najczęściej zgłasza się podrażnienie gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny może początkowo powodować czkawkę. Wymienione działania niepożądane ustępują zwykle po kilku dniach leczenia. Jeżeli występują nadal należy skonsultować się z lekarzem.

Do innych objawów niepożądanych należą:

- bardzo często: bóle głowy, uczucie dyskomfortu, czkawka,
- często: zawroty głowy, nudności, wymioty,
- niezbyt często: kołatanie serca, rumień pokrzywka,
- rzadko i bardzo rzadko: przejściowe migotanie przedsionków, bóle jamy ustnej i gardła, bóle mięśni żuchwy, reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy.

Producent

MCNEIL AB
Szwecja
Helsingborg