

Nicorette Icy White Gum 4 mg Guma do żucia, lecznicza, 105 sztuk



Cena: 136,55 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NICORETTE
Opakowanie	105 sztuk
Postać	guma do żucia
Producent	MCNEIL AB
Przeznaczenie	Rzucanie palenia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nicorette Icy White Gum 2 mg wspomaga rzucenie palenia u osób zdecydowanych na zerwanie z nałogiem. Zaleca się stosowanie gumy przez co najmniej 3 miesiące, po czym należy stopniowo zmniejszać jej dawkowanie. Proces leczenia powinien zakończyć się, gdy dzienna dawka zostanie ograniczona do 1-2 gum.

Wskazania

Nicorette Icy White Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

- Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (Test Fagerströma uzależnienia nikotynowego (FTND) < 6 lub palenie ≤ 20 papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 15 gum na dobę.

Technika żucia:

- Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.
- Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.
- Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.
- Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut.



Skład

Jedna guma zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku Nicorette Icy White Gum należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego,
- bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej,
- niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,
- choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
- nadczynności tarczycy,
- cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane mniejsze dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia),
- stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy,
- ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby,
- ciężkiej choroby nerek,
- zapalenia przełyku.

Producent

MCNEIL