

Nifuroksazyd Aflofarm, 200 mg, tabletki powlekane, 12 tabletek

Cena: 6,73 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwbiegunkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Nifuroksazyd Aflofarm to lek przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Zawiera substancję czynną nifuroksazyd wykazującą działanie przeciwbakteryjne, stosowaną w leczeniu ostrych i przewlekłych biegunk wywołanych przez bakterie.

Wskazania

Produkt leczniczy zalecany jest do stosowania w ostrych i przewlekłych biegunkach pochodzenia bakteryjnego oraz innych schorzeniach przebiegających z biegunką.

Działanie

Nifuroksazyd Aflofarm wykazuje się działaniem przeciwbakteryjnym w świetle jelita w stosunku do wybranych gatunków bakterii. Nie niszczy naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego oraz nie powoduje powstania szczepów opornych. Lek nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany z organizmu w postaci niemienionej.

Dawkowanie

- Dorośli: 4 tabletki (800 mg) na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
- Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 3 do 4 tabletek (600 mg do 800 mg) na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Skład

- Substancją czynną leku jest nifuroksazyd (Nifuroxazidum).
- Każda tabletkę powlekana zawiera 200 mg nifuroksazydu (Nifuroxazidum).
- Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka Opadry II White: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu, u dzieci w wieku poniżej 6 lat, niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej).

Ostrzeżenia

- Jeśli pomimo leczenia biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni lub objawi się nasilają należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (duszność, wysypka, świąd) produkt leczniczy należy natychmiast zaprzestać stosowania leku.
- Podczas leczenia biegunki konieczne jest stałe uzupełnianie płynów, średnio 2 litry wody na dobę dla osoby dorosłej. W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów i niechęci do jedzenia należy rozważyć możliwość nawadniania drogą dożylną.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Galeria

