

Nifuroksazyd Polfarmex 200 mg, 20 tabletek powlekanych

Cena: 11,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	POLFARMEX S.A.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Przeciwbiegunkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 7 lat

Opis produktu

Opis

Nifuroksazyd Polfarmex to lek przeciwbakteryjny zawierający pochodną 5-nitrofuranu, który działa lokalnie w świetle jelita przeciwko niektórym bakteriom. Istotne jest, że substancja czynna leku nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie niszczy naturalnie występujących bakterii niechorobotwórczych. Nifuroksazyd jest wydalany w niezmienionej postaci z kałem, a jego stosowanie nie prowadzi do rozwoju odpornych szczepów bakterii.

Lek Nifuroksazyd Polfarmex jest zalecany do stosowania w przypadku ostrej i przewlekłej biegunki bakteryjnej, w tym w zakażeniach pokarmowych. Preparat przeciwbiegunkowy zawierający 200 mg nifuroksazydu może być stosowany u dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia.

Wskazania

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażenia bakteryjnego przewodu pokarmowego.

Działanie

Przeciwbakteryjne i przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie

- Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 podzielonych dawkach.
- Dzieci w wieku powyżej 7 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 podzielonych dawkach.

Skład

1 tabletka powlekana zawiera:

- substancję czynną: nifuroksazyd (Nifuroksazidum) 200 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, Powidon K-25, magnezu stearynian; otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żółty tlenek żelaza (E 172).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną, nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia (ze względu na postać produktu - tabletki).

Działania niepożądane

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- wysypka,
- krosty na skórze.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- granulocytopenia (zmniejszenia liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów),
- świerzbiczna guzkowa w przebiegu alergii kontaktowej na nifuroksazyd,
- bóle brzucha, nudności, nasilenie biegunki

Ostrzeżenia

- W razie podejrzenia zakażenia o uogólnionym przebiegu, należy podać antybiotyk wchłaniający się z przewodu pokarmowego lub działający ogólnie.
- Podczas leczenia niezbędne jest nawadnianie pacjenta oraz kontrola i uzupełnianie niedoborów elektrolitów.
- Bez konsultacji lekarskiej, nifuroksazyd nie powinno się stosować dłużej niż 3 dni (nie ma wskazań do przedłużonej terapii).
- W przypadku utrzymywania się biegunki po 3 dniach leczenia niezbędna jest pogłębiona diagnostyka mająca na celu ustalenie przyczyny objawów i rozważenie rozpoczęcia antybiotykoterapii.
- W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (duszność, obrzęk twarzy, warg, języka, wysypka, świąd) produkt leczniczy należy natychmiast odstawić.
- Należy nawadniać się dużą ilością płynów, słodkich lub słonych, w celu uzupełnienia utraconych płynów spowodowanych biegunką (średnie zapotrzebowanie na wodę u osoby dorosłej wynosi 2 litry).
- Należy kontynuować spożywanie posiłków przez cały okres trwania biegunki z wyłączeniem niektórych produktów spożywczych, w szczególności surowych warzyw, owoców, zielonych warzyw, pikantnych potraw, jak również mrożonej żywności i zimnych napojów. Preferuje się spożywanie grillowanego mięsa oraz ryżu.
- W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia, należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną.
- Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktozy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
- Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu leczniczego Nifuroksazyd.
- W przypadku podejrzenia przedawkowania pacjent powinien być stale monitorowany. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Producent

POLFARMEX
Józefów 9
Kutno

Galeria

