

NiQuitin 7 mg/24 h Przezroczysty Preparat pomagający rzucić palenie stopień 3 7 plastrów



Cena: 87,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	7 szt.
Postać	syst.transderm., plast.
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu

Stosowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Plaster należy stosować raz na dobę. Szczegółowe informacje są zawarte w załączonej ulotce. Palący więcej niż 10 papierosów dziennie powinni przestrzegać poniższego, trójstopniowego schematu dawkowania:

Stopień 1

NiQuitin Przezroczysty 21 mg/24 godz.

6 tygodni

początkowy okres kuracji

Stopień 2

NiQuitin Przezroczysty 14 mg/24 godz.

2 tygodnie

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Stopień 3

NiQuitin Przezroczysty 7 mg/24 godz.

2 tygodnie

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Uwaga: Palący 10 lub mniej papierosów dziennie powinni rozpocząć kurację od stopnia 2 (14 mg/24 godz.) trwającego 6 tygodni, a następnie przejść do stopnia 3 (7 mg/24 godz.) i kontynuować leczenie przez 2 tygodnie.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ważne

Skład:

1 plaster o powierzchni 7 cm² do stosowania na skórze, zawierający 36 mg nikotyny jako substancję czynną, dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Każdy plaster zawiera następujące substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, lepki laminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, biały atrament.

Pozwolenie nr: 9857

OTC - Lek wydawany bez recepty

7 plastrów = 1 tydzień leczenia

Opis

NiQuitin 7 mg/24 h Przezroczysty Preparat pomagający rzucić palenie stopień 3 7 plastrów

Galeria

