

NiQuitin Mini 4 mg, 60 tabletek do ssania

Cena: 78,66 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki do ssania
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 17 lat

Opis produktu

Opis

NiQuitin Mini 4 mg to lek stosowany jako terapia zastępcza nikotynowa dla dorosłych osób uzależnionych od tytoniu. Przyjmowanie tabletek zmniejsza pragnienie zapalenia papierosa, łagodzi objawy odstawienia nikotyny i wspomaga całkowite zaprzestanie palenia. Produkt dostępny w poręcznym opakowaniu przypominającym zapalniczkę zawiera 60 tabletek do ssania z nikotyną w dawce 4 mg. Jest przeznaczony dla osób, które palą ponad 20 papierosów dziennie. Tabletki NiQuitin Mini 4 mg nie zawierają substancji smolistych, tlenku węgla ani innych szkodliwych związków chemicznych obecnych w tytoniu, co korzystnie wpływa na zdrowie użytkowników.

Wskazania

- Leczenie uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia.
- Końcowym celem terapii jest trwale zaprzestanie palenia tytoniu.
- Wskazane do stosowania u dorosłych i młodzieży (w wieku 12-17 lat). U młodzieży produkt ten powinien być stosowany tylko po zasięgnięciu porady fachowego personelu medycznego.

Działanie

Łagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Dawkowanie

Dorośli:

- na początku leczenia stosować 8 do 12 tabletek na dobę. Ssać tabletkę, kiedy poczuje się chęć zapalenia papierosa,
- po upływie nie więcej niż 6 tygodni należy stopniowo zmniejszać ilość przyjmowanych tabletek,
- leczenie należy zakończyć, kiedy ilość przyjmowanych tabletek zmaleje do 1-2 na dobę.

Młodzież w wieku 12-17 lat: Lek może być podawany młodzieży w wieku 12-17 lat jedynie po zaleceniu przez fachowy personel medyczny.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: nikotyna (Nicotinum) 4 mg (w postaci nikotyny z kationitem),
- pozostałe składniki: mannitol, sodu alginian, guma ksantan, potasu wodorowęglan, wapnia polikarbofil, sodu węglan bezwodny, acesulfam potasowy, aromat mentolowy, aromat miętowy, aromat korygujący smak.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Lek nie powinien być stosowany przez osoby niepalące oraz dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- lekkie podrażnienie lub bolesność języka lub ust,
- nudności.

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- ból lub zapalenie gardła,
- nudności, uczucie dyskomfortu w żołądku, biegunka, niestrawność/zgaga, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, czkawka.

Niezbędnie często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

- nerwowość, depresja,
- palpitacje (uczucie silnego bicia serca), przyspieszona czynność serca, ból w klatce piersiowej,
- wysypka,
- zmęczenie i ogólne złe samopoczucie.

Bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym pojawieniem się świszczącego oddechu lub uczucia ucisku w klatce piersiowej, wysypki skórnej lub uczucia możliwości wystąpienia omdlenia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- drgawki,
- dysfagia (trudności w przełykaniu), odbijanie ze zwracaniem gazu z żołądka przez usta (głośnie odbijanie), nadmierne wydzielanie śliny,
- choroby grypopodobne (objawy grypopodobne),
- reakcja nadwrażliwości,
- drżenie, zaburzenia smaku, parestezje w obrębie ust (mrowienie lub drętwienie ust),
- duszność,
- swędzenie lub wysypka, opuchlizna skóry lub błony śluzowej, zaczerwienienie skóry, nadmierne pocenie się.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić z fachowym personelem medycznym, jeśli pacjent: niedawno przeżył zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, choruje na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową. ma ciężkie zaburzenia rytmu serca.
- Podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tabletek do ssania NiQutin MINI z gumą do żucia zawierającą nikotynę.
- Należy zasięgnąć porady fachowego personelu medycznego, jeśli pacjent: ma problemy z sercem, krążeniem, stabilną dławicę piersiową, wysokie ciśnienie tętnicze lub choroby okluzyjnej tętnic obwodowych, ma cukrzycę, ma ciężką lub umiarkowaną niewydolność wątroby lub nerek; ma nadczynność tarczycy lub guz chromochłonny nadnerczy; ma owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy lub zapalenie przełyku; ma/miał kiedykolwiek napady padaczki; przeżył kiedykolwiek reakcje alergiczne.

Producent

Perrigo Poland Sp.z o.o.
Al. Niepodległości 18 BTD Office Center, 2 piętro
02-653 Warszawa

Galeria

