

## NiQuitin Pastyłki do ssania 4 mg 72 sztuki



Cena: 117,01 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NIQUITIN
Opakowanie	72 sztuk
Postać	Pastyłki do ssania
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Palenie, Uzależnienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

Pastyłki do ssania NiQuitin to lek, który dostarcza organizmowi nikotynę terapeutyczną, wspierając proces rzucania palenia i jednocześnie łagodząc objawy odstawienia nikotyny. W przeciwieństwie do tytoniu, produkt NiQuitin nie zawiera szkodliwych substancji smolistych, tlenku węgla ani innych niezdrowych związków chemicznych. Ten lek jest przeznaczony do stosowania w ramach nikotynowej terapii zastępczej i dostarcza ściśle kontrolowane dawki nikotyny terapeutycznej, które pomagają złagodzić głód nikotynowy oraz objawy odstawienia, co ułatwia rzucenie palenia. Zaleca się także korzystanie z programu psychologicznego, który wspiera proces rzucania palenia.

Tabletki do ssania NiQuitin o smaku miętowym z dawką 4 mg nikotyny są dedykowane osobom, które sięgają po pierwszego papierosa w ciągu 30 minut od przebudzenia.

#### Wskazania

Łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

#### Działanie

Łagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

#### Dawkowanie

- tydzień 1. do 6. - 1 pastylka do ssania co 1-2 godziny, co najmniej 9, ale nie więcej niż 15 pastylek na dobę,
- tydzień 7. do 9. - 1 pastylka do ssania co 2-4 godziny;
- tydzień 10. do 12. - 1 pastylka do ssania co 4-8 godzin;
- aby móc powstrzymać się od palenia przez następne 12 tygodni: stosować 1 lub dwie pastylki na dobę, tylko w przypadkach silnej ochoty zapalenia papierosa.

#### Skład

1 tabletką zawiera:

- substancję czynną: nikotynę (Nicotinum) 4 mg,
- pozostałe składniki: mannitol (E421), alginian sodu (E401), guma ksantanowa (E415), wodorowęglan potasu (E501), węglan sodu bezwodny, aspartam (E951), stearynian magnezu, aromat mięty pieprzowej (zawiera maltodekstrynę i skrobię modyfikowaną).

#### Przeciwwskazania

Nie stosować leku NiQuitin:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek ze składników leku;
- jeśli u pacjenta niedawno wystąpił zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu;
- jeśli u pacjenta występuje niestabilna i nasilająca się dławica piersiowa, dławica Prinzmetala, ciężkie zaburzenia rytmu serca;
- jeśli pacjent jest chory na fenyloketonurię;

#### Działania niepożądane

- nudności.
- wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, suchość w jamie ustnej, zaparcia, czkawka, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

dyskomfort w jamie ustnej, zgaga, podrażnienia lub owrzodzenia jamy ustnej,

- ból głowy, zawroty głowy,

#### Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.