

Nizoral, krem, 30 g

Cena: 34,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g (tub.)
Postać	krem
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwgrybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Krem **Nizoral** zawiera ketokonazol jako substancję czynną, wykazującą silne działanie przeciwgrybicze.

Wskazania

Miejscowe leczenie grzybicy skóry tułowia, pachwin, rąk i stóp wywołanych następującymi dermatofitami: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*, a także drożdżycy skóry i łupieżu pstrego (*Pityriasis versicolor*). Lek **Nizoral**, krem jest także zalecany w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry, związanego z obecnością drożdżaka *Malassezia ovale* (*Pityrosporum ovale*).

Działanie

Ketokonazol działa na dermatofity z rodzaju: *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum* i drożdżaki z rodzaju *Candida* i *Malassezia* (*Pityrosporum*).

Dawkowanie

- Drożdżycę skóry, grzybica tułowia, pachwin, grzybica rąk i stóp, łupież pstry (*Pityriasis versicolor*): zwykle pokrywa się lekiem **Nizoral**, krem chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz skórę bezpośrednio do nich przylegającą raz na dobę.
- Łojotokowe zapalenie skóry: w zależności od nasilenia objawów zakażenia zwykle stosuje się lek **Nizoral**, krem na chorobowo zmienione miejsca na skórze raz lub dwa razy na dobę.

Średni czas leczenia:

- łupież pstry od 2 do 3 tygodni,
- zakażenia drożdżakami od 2 do 3 tygodni,
- grzybica pachwin od 2 do 4 tygodni,
- grzybica tułowia od 3 do 4 tygodni,
- grzybica stóp od 4 do 6 tygodni,

- łojotokowe zapalenie skóry od 2 do 4 tygodni.

Skład

- Substancją czynną leku jest ketokonazol.
- Inne składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, sodu siarczyn bezwodny (E 221), polisorbat 80, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nizoral, krem

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ketokonazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

W czasie leczenia lekiem Nizoral, krem mogą wystąpić następujące objawy działań niepożądanych leku:

- często (u więcej niż 1 na 100 i u mniej niż 1 na 10 pacjentów) rumień i świąd w miejscu podania oraz uczucie pieczenia skóry;
- niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 i u mniej niż 1 na 100 pacjentów) w miejscu podania mogą wystąpić krwawienia, uczucie dyskomfortu i suchości, stan zapalny, podrażnienie, parestezje (przykre wrażenia, najczęściej mrowienia, drętwienia lub zmian temperatury skóry, tj. uczucie silnego gorąca lub zimna), reakcje w miejscu podania, nadwrażliwość, zmiany pęcherzykowe, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, łuszczenie i lepkość skóry.
- Po wprowadzeniu leku Nizoral, krem do obrotu bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) występowała pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Lek Nizoral, krem zawiera substancje pomocnicze, m.in. glikol propylenowy i alkohol cetylowy. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość alkoholu stearylowego i cetylowego lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Producent

MCNEIL C/O JOHNSON&JOHNSON