

Nolpaza control 20mg 14 tabletek



Cena: 9,01 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NOLPAZA
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Działanie **Nolpaza Control** na dolegliwości związane z chorobą refluksową jest oparte na hamowaniu produkcji kwasu solnego w żołądku. Choroba refluksowa przełyku polega na cofaniu się treści żołądkowej do przełyku, co może powodować różnego rodzaju objawy, takie jak pieczenie w klatce piersiowej, zgaga i kwaśny smak w ustach.

Nolpaza Control zawiera substancję czynną o nazwie pantoprazol, która jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej blokują działanie komórek okładzinowych w błonie śluzowej żołądka, które produkują kwas solny. Dzięki temu zmniejsza się ilość wydzielanego kwasu solnego, co może pomóc w złagodzeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak:

- zgaga,
- kwaśne odbijanie

Działanie

Lek zmniejsza ilość kwasu żołądkowego.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 1 tabletkę na dobę. Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: pantoprazol 20mg (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego),
- substancje pomocnicze: w rdzeniu tabletki: mannitol, krospowidon (typ A), krospowidon (typ B), sodu węglan bezwodny, sorbitol, wapnia stearynian oraz w otoczce tabletki: hypromeloza, powidon (K25), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E 172),



glikol propylenowy, makrogol 6000, talk oraz kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) zawierający: sodu laurylosiarczan, polisorbat 80.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nolpaza control:

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (w leczeniu zakażenia HIV).

Działania niepożądane

- Obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

Ostrzeżenia

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

- jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności przez 4 lub więcej tygodni;
- ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;
- ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter dotychczasowych objawów choroby refluksowej;
- przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;
- ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę;
- jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;
- będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy;

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

KRKA, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia