

Nomigren 12,5 mg, 2 tabletki powlekane

Cena: 32,54 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NOMIGREN
Opakowanie	2 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwmigrenowe
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nomigren 12,5 mg to lek przeciwmigrenowy, którego substancją czynną jest almotryptan. Działa przeciwbólowo i jest przeznaczony do doraźnego leczenia ostrych napadów migreny, zarówno z aurą, jak i bez niej.

Wskazania

- Doraźne leczenie bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny przebiegającego z aurą lub bez aury.
- Lek może być stosowany jedynie u pacjentów, u których lekarz rozpoznał migrenę inną niż migrena podstawna, hemiplegiczna lub oftalmoplegiczna.

Działanie

Przeciwmigrenowe, przeciwbólowe.

Dawkowanie

- Dorośli od 18 do 65 lat: 1 tabletka (12,5 mg).
- Dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (12,5 mg).

Skład

Substancją czynną leku jest almotryptan (Almotriptanum).

Każda tabletka zawiera 12,5 mg almotryptanu (Almotriptanum) w postaci almotryptanu jabłczanu.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K29-32, sodu stearylofumarat. Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, воск, carnauba.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent: ma nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ma chorobę niedokrwinną serca (zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, udokumentowane nieme niedokrwienie, dusznica Prinzmetala); ma ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze; przebył zdarzenie naczyniowo-mózgowe (CVA) lub ma przemijający napad niedokrwienności mózgu (TIA); ma choroby naczyń obwodowych; ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Działania niepożądane

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

- zawroty głowy,
- senność,
- zmęczenie,
- nudności,
- wymioty.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

- uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia (parestezje),
- ból głowy
- uczucie dzwonięcia, szumu lub strzykania w uszach (szumy uszne),
- nierówne bicie serca (kołatanie serca),
- uczucie ściskania w gardle,
- biegunka,
- niestrawność,
- suchość w ustach,
- ból mięśni,
- ból kości,
- ból w klatce piersiowej,
- uczucie osłabienia (astenia).

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

- skurcz naczyń krwionośnych w sercu (skurcz naczyń wieńcowych),
- atak serca (zawał mięśnia sercowego),
- przyspieszona akcja serca (częstoskurcz).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- napad padaczkowy,
- zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie (zaburzenia widzenia mogą również wystąpić podczas samego napadu migreny),
- skurcz naczyń krwionośnych jelit, który może prowadzić do uszkodzenia jelit (niedokrwienia jelit),
- ból brzucha i krwawa biegunka.

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność i omówić z lekarzem jeśli: postać migreny nie została jednoznacznie rozpoznana, ponieważ leku Nomigren nie należy stosować w leczeniu migreny podstawnej (migrena z objawami aury takimi jak podwójne widzenie, trudności w artykulacji słownej, niezdarne i nieskoordynowane ruchy, szum w uszach, obniżony poziom świadomości), hemiplegicznej (migrena z aurą, w tym z jednostronnym osłabieniem mięśni) ani oftalmoplegicznej (migrenowy ból głowy z udziałem jednego lub więcej nerwów oczodołu powodujący osłabienie mięśni sterujących ruchem gałek ocznych); pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki przeciwbakteryjne, przede wszystkim leki stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych (sulfonamidy); pacjent wie, że jest uczulony na antybiotyki, ale nie jest pewien czy jest uczulony na sulfonamidy; objawy bólu głowy różnią się od zwykłych napadów migreny, na przykład pacjent odczuwa dzwonięcie w uszach lub zawroty głowy, ma krótkotrwałe porażenie jednej strony ciała lub mięśni kontrolujących ruchy oczu lub jakiegokolwiek inne nowe objawy; u pacjenta występują czynniki podwyższające ryzyko wystąpienia choroby serca (niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu, występowanie chorób serca w rodzinie, stan po menopauzie u kobiet lub wiek powyżej 40 lat u mężczyzn); pacjent ma łagodną lub umiarkowaną niewydolność wątroby; pacjent ma ciężką niewydolność nerek; pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, ponieważ jest wówczas narażony na wzrost ciśnienia krwi.

Producent

HASCO-LEK

Żmigrońska 242e
Wrocław

Galeria

