

Normalac, 66,7 g/100 ml, syrop, 200 ml



Cena: 16,47 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	200 ml
Postać	Syrop
Producent	L.MOLTENI & C. DEI F.LII ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO SPA
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis
Normalac to lek przeznaczony do regulacji wypróżnień, działając poprzez zwiększenie zawartości wody w stolcu.

Wskazania

- Encefalopatia wątrobowa (zaburzenia neuropsychiczne powstałe w wyniku uszkodzenia wątroby, a zwłaszcza marskości wątroby);
- Zaparcia (regulacja wypróżnień).

Działanie
Normalac wykazuje działanie przeczyszczające, jest środkiem osmotycznym. Laktuloza jest rozkładana w jelicie grubym przez m.in. *Lactobacillus acidophilus* do dwutlenku węgla i niskocząsteczkowych kwasów organicznych (kwasu mlekowego, octowego, mrówkowego).

Obecność tych kwasów powoduje spadek pH w świetle jelita grubego, a tym samym zwiększenie kwasowości, co ma istotny wpływ na wiele procesów metabolicznych oraz równowagę flory bakteryjnej w jelitach. Kwasy wytworzone z laktulozy regulują również cykl wypróżnień.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież 15-45 ml 15-30 ml
- Dzieci (7-14 lat) 15 ml 10-15 ml
- Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml 5-10 ml
- Niemowlęta (poniżej 1 roku) do 5 ml do 5 ml

Skład



- Substancją czynną jest: laktuloza (Lactulosum).
- Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, aromat śmietankowy N.7-bis, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Normalac:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma galaktozemię (wrodzone zaburzenie przemiany cukrów – niezdolność przekształcenia galaktozy w glukozę),
- jeśli pacjent ma niedrożność jelit (silne kurczowe bóle brzucha, wymioty, wzdęcia, pacjent nie oddaje wiatrów ani stolca),
- jeśli pacjent ma ostre choroby zapalne jelit, w tym wrzodziejące zapalenie okrężnicy i odbytnicy, chorobę Leśniowskiego-Crohna (objawiającą się m.in. przewlekłą biegunką).

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- nadmierne oddawanie gazów (wiatry),
- bóle brzucha,
- biegunka,
- wzdęcia (szczególnie w dużych dawkach).

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować leku w przypadku występujących bólów brzucha, nudności, wymiotów.
- Przed zastosowaniem leku pacjent powinien powiedzieć lekarzowi o: cukrzycy (w leku obecna jest m.in. laktoza, fruktoza), uporczywych zaparciach.
- Lek Normalac zawiera laktozę jednowodną, galaktozę, fruktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji któregoś z wymienionych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywanie leku w niskiej temperaturze może spowodować jego zgęstnienie. Po ogrzaniu konsystencja leku powróci do stanu wyjściowego.
- Ewentualne ściemnienie roztworu nie ma wpływu na właściwości terapeutyczne.

Producent

MOLTENI
Obrońców Modlina 3
Kraków