


Normosan fix, zioła do zaparzania, 1,4 g, 20 sztuk



Cena: 12,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 saszetek
Postać	Zioła
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Napar z mieszanki jest stosowany jako środek przeczyszczający w przypadku zaparc.

Dawkowanie

1 saszetkę zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać przez około 15 minut. Przed udaniem się na spoczynek wypić jednorazowo od 2/3 do całości przygotowanego naparu. Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6-10 godzinach. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Przy pierwszym stosowaniu najlepiej wypić 2/3 szklanki naparu. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi można następnym razem (nie wcześniej niż po upływie doby) zwiększyć dawkę do całej szklanki naparu.

Skład

1 saszetka 1,4 g zawiera:

- Kora kruszyny (Frangulae cortex) - 0,230-0,330 g
- Liść senesu (Sennae folium) - 0,110-0,200 g
- Owoc kminku (Carvi fructus) - 0,490 g
- Owoc bzu czarnego (Sambuci fructus) - 0,142-0,332 g
- Liść mięty pieprzowej (Menthae pip. folium) - 0,238 g
- Każda saszetka 1,4 g zawiera 22,02-29,79 mg antrapochoodnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na kruszynę, senes lub którykolwiek składnik produktu.
- Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha nieznanego pochodzenia, niewydolność nerek, krwawienia miesięczne, odwodnienie organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (głównie hipokaliemia).

Działania niepożądane

Bardzo rzadko u osób z nadwrażliwością mogą wystąpić: świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka. W bardzo rzadkich przypadkach kora kruszyny i liście senesu mogą powodować skurczowe bóle w obrębie jamy brzusznej oraz wodnisty stolec, w szczególności u pacjentów z zespołem nadpobudliwego jelita. Symptomy te często są wynikiem przedawkowania leku i w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.

Ostrzeżenia

- Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających.
- Stosowanie leku powyżej 7 dni może prowadzić do uzależnienia z koniecznością zwiększania dawki, atonią okrężnicy z upośledzeniem funkcji i nasilenia się zaparć.

Producent

POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański

Galeria

