

Normosan, zioła do zaparzania, mieszanka ziołowa, 100 g



Cena: 12,79 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NORMOSAN
Opakowanie	100 g
Postać	Zioła
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Normosan to lek przeczyszczający stosowany w leczeniu zaparć u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia.

Wskazania

Normosan jest lekiem stosowanym w zaparciach.

Działanie

Normosan to lek wykazujący działanie przeczyszczające dzięki zawartym pochodnym związków antracenowych w liściu senesu i korze kruszyny. Związki te pobudzają perystaltykę jelita grubego co wpływa na przyspieszony pasaż jelitowy. Dodatkowo związki te wpływają również na hamowanie absorpcji wody i elektrolitów przez jelito grube oraz zwiększają przepuszczalność, co wpływa na wydzielanie wody i elektrolitów do światła jelita.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1,4 g ziół (3/4 łyżki miarkowej) zalać 1 szklanką zimnej wody, następnie zagotować pod przykryciem. Po ok. 15 minutach odcedzić. Gotowy odwar pić wieczorem, po jedzeniu (od 2/3 do całości przygotowanego odwaru).

Skład

- Substancjami czynnymi są: kora kruszyny (*Rhamnus frangula*, cortex), liść senesu (*Cassia senna* L. lub *Cassia angustifolia*, folium), owoc kminku (*Carum carvi*, fructus), owoc bzu czarnego (*Sambucus nigra*, fructus), liść mięty pieprzowej (*Mentha x piperita*, folium).
- 100 g mieszanki zawiera 20 g kory kruszyny, 10 g liści senesu, 35 g owoców kminku, 18 g owoców bzu czarnego, 17 g liści mięty pieprzowej.
- 1,4 g mieszanki zawiera 19,6-29,4 mg antrapochoodnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Normosan w przypadku: nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne, mentol, rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae; anyż, kminek, seler, kolendra, koper), rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, Compositae); niedrożności, zwężenia, atoni jelit, choroby zapalnej okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenia wyrostka robaczkowego, bólu brzucha nieznanego pochodzenia, odwodnienia organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (głównie hipokaliemia); pacjentów z niedoborem lub brakiem kwasu solnego w żołądku, chorobą wątroby, kamieniami żółciowymi, zapaleniem dróg żółciowych lub innymi chorobami żółciowymi.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: skurczowe bóle brzucha w obrębie jamy brzusznej, wodnisty stolec - objawy świadczące o przedawkowaniu, należy w takim przypadku zmniejszyć dawkę, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, białkomocz, krwimocz (przy długotrwałym stosowaniu), zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśniowe (skutkiem zaburzonej równowagi elektrolitowej i długotrwałym stosowaniem), zmiany pigmentacyjne w błonie śluzowej jelita grubego, żółte lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu (zależne od pH).

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku, gdy pacjent przyjmuje leki moczopędne, leki przeciwartmyczne, adrenokortykosteroidy, produkty z lukrecją.
- Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów z uporczywymi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego.
- Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających, przyczyna zaparć powinna być zbadana przez lekarza (szczególnie gdy istnieje potrzeba codziennego stosowania leku Normosan).
- Dłuższe stosowanie niż 7 dni może prowadzić do atonii okrężnicy z upośledzeniem jej funkcji i nasilenia zaparć.
- Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek są bardziej narażeni na zaburzenia równowagi elektrolitowej.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Producent

POLPHARMA S.A.
Pełplińska 19
Starogard Gdański

Galeria

