

Nosox Junior 0,025%, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Aerozol
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dziecka, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Nosox Junior 0,025% to aerozol do nosa przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Zawiera oksymetazolinę chlorowodorek jako substancję czynną, która zwęża naczynia krwionośne. Lek ten zmniejsza obrzęk zapalnie zmienionej błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co umożliwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów zatok przynosowych oraz odblokowania trąbek słuchowych, co ułatwia usuwanie wydzieliny i leczenie zakażeń bakteryjnych.

Wskazania

Lek Nosox Junior 0,025%, aerozol do nosa stosuje się:
w obrzęku błon śluzowych występującym w:

- ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- zapaleniu trąbki słuchowej,
- zapaleniu zatok przynosowych,
- naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- zapaleniu ucha środkowego.

Działanie

Lek Nosox Junior zwęża naczynia krwionośne, dzięki czemu redukuje obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej, hamuje nadmierne wydzielanie oraz ułatwia oddychanie. Ponadto powoduje otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz odblokowuje trąbki słuchowe.

Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia do 6 lat: 1 dawka aerozolu (1 naciśnięcie pompki do oporu) do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Nie należy stosować produktu częściej niż 3 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancja czynna: 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodoru,
- substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Leku Nosox Junior 0,025%, aerozol do nosa nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci w pierwszym roku życia,
- jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

- pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa,
- kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- kołatanie serca,
- wzrost ciśnienia tętniczego,
- przyspieszenie czynności serca.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- bóle i zawroty głowy,
- zmęczenie,
- bezsenność,
- niepokój.

Ostrzeżenia

- Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania leku.
- Skuteczność leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może się zmniejszyć (tachyfilaksja) wskutek ich dłuższego stosowania niż zalecane lub przedawkowania. Może to prowadzić do stosowania coraz większych dawek lub częstszego stosowania leku, co z kolei może skutkować stałym stosowaniem leku.
- W przypadku dłuższego stosowania niż zalecane lub nadużywania leku należy natychmiast zaprzestać jego stosowania.
- Stałe stosowanie leku prowadzić może do utrudniającego oddychanie obrzęku spowodowanego reaktywnym przekrwieniem błony śluzowej nosa (efekt odbicia) i przewlekłego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, a także zaniku błony śluzowej lub suchego zapalenia błony śluzowej nosa.
- Efekt odbicia i tachyfilaksja powinny ustąpić po przerwaniu stosowania leku.
- Podobnie nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław