

Nurofen dla dzieci, 125 mg, czopki, 10 sztuk

Cena: 41,55 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	NUROFEN
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Nurofen dla dzieci to lek działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Wskazania

Nurofen dla dzieci stosuje się w leczeniu bólów o nasileniu słabym do umiarkowanego oraz w bólu i gorączce występujących w przebiegu grypy.

Działanie

Lek Nurofen dla dzieci działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Dawkowanie

- Dla dzieci o wadze od 12,5 kg do 17 kg (2-4 lata): dawka początkowa 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 do 8 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby.
- Dla dzieci o wadze od 17 kg do 20,5 kg (4-6 lat): dawka początkowa 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 godzinach. Nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby.

Skład

- Substancja czynna leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).
- 1 czopek zawiera 125 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: tłuszcz stały.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu.
- jeśli u pacjenta, występowały w przeszłości reakcje nadwrażliwości po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek oraz niekontrolowana niewydolność serca.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

- zakażenia skóry,
- zaburzenia układu krwiotwórczego,
- ostra niewydolność nerek,
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

- biegunka,
- wzdęcia,
- zaparcia,
- wymioty.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

- nadwrażliwość z pokrzywką i świądem,
- bóle głowy,
- ból brzucha, nudności i niestrawność,
- wysypka skórna.

Częstość nieznana:

- niewydolność serca i obrzęk,
- nadciśnienie tętnicze,
- reaktywność dróg oddechowych, w tym astma.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nurofen dla dzieci u pacjentów z chorobami tkanki łącznej, stosujących inne NLPZ, z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, z zaburzeniami czynności wątroby.
- Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych.
- Zaleca się unikania stosowania ibuprofenu u pacjentów z ospą wietrzną.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa