

Nurofen dla dzieci Forte 200 mg/5 ml, smak pomarańczowy, zawiesina doustna, 150 ml



Cena: 33,07 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	Zawiesina
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Ząbkowanie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka

Opis produktu

Opis

Nurofen dla dzieci Forte to doustna zawiesina o pomarańczowym smaku, wyróżniająca się skoncentrowanym składem ibuprofenu, który pozwala na skuteczne działanie przy mniejszej objętości przyjmowanego leku. Dzięki temu dziecko musi połyknąć mniej płynu. Preparat wyposażony jest także w praktyczną, precyzyjną strzykawkę, ułatwiającą dokładne i bezpieczne dawkowanie.

Wskazania

- Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.
- Objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki.

Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.
- Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantanowa, aromat pomarańczowy 2M16014 (skrobia modyfikowana, guma arabska, maltodekstryna, naturalne i identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne) i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Jeśli dziecko ma uczulenie na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar, obrzęk twarzy i (lub) dłoni lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ).
- Jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ.

- Jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia).
- Jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby i nerek.
- Jeśli występuje ciężka niewydolność serca.
- Jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie.
- Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia.
- Jeśli występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.
- U dzieci z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).
- Nie przyjmować leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): zgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, wymioty, wzdęcia, zaparcia. Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem, równe wysypki skórne, zaburzenia widzenia, bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie. Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): szumy uszne, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10000 osób): zapalenie przełyku, niewydolność serca, kołatanie serca, wysokie ciśnienie krwi. Częstość nieznana: reaktywność dróg oddechowych.

Ostrzeżenia

Jeśli dziecko przebyło ostatnio poważny zabieg chirurgiczny, Jeśli dziecko jest odwodnione, ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek u dzieci odwodnionych. Jeśli u dziecka występowało lub występuje astma, lub choroby alergiczne, które mogą powodować duszność. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Reckitt Benckiser
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki