

# Nurofen dla dzieci Junior Zawiesina doustna o smaku truskawkowym 100 ml



Cena: 36,37 zł

## Opis słownikowy

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn            |
| Marka           | NUROFEN  |
| Opakowanie      | 100 ml (butelka)                                 |
| Postać          | Zawiesina doustna                                |
| Producent       | RECKITT BENCKISER POLAND S.A.                    |
| Przeznaczenie   | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                  |
| Wiek            | Dla młodzieży                                    |

## Opis produktu

### Opis

**Nurofen dla dzieci Junior** o truskawkowym smaku to doustna zawiesina lecznicza. Jego aktywnym składnikiem jest ibuprofen, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek ten posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Nurofen Junior jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skuteczny w leczeniu gorączki o różnym pochodzeniu oraz łagodnych do umiarkowanych bólach różnego rodzaju.

### Wskazania

- objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego,
- objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki.

### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6-9 lat (20-30 kg): 5 ml 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 9-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę.

### Skład

1 ml zawiesiny doustnej zawiera:

- substancję czynną: 40 mg ibuprofenu,
- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbát 80, bromek domifenu, maltitolciekły (E965), glicerol, gumę ksantan, aromat truskawkowy 500244E (zawierający glikol propylenowy, kwas askorbowy E300 i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne) i wodę oczyszczoną.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ),
- jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ,
- jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia),
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

### Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- zgaga,
- bóle brzucha,
- nudności,
- niestrawność, (mogą
- biegunka,
- wymioty,
- wzdęcia,
- zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem,
- równe wysypki skórne,
- zaburzenia widzenia,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- bezsenność,
- pobudzenie,
- drażliwość lub zmęczenie.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

- szумы uszne,
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny,
- zwiększenie stężenia mocznika we krwi,
- zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

### Ostrzeżenia

- Jeśli dziecko przeżyło ostatnio poważny zabieg chirurgiczny,
- Jeśli dziecko jest odwodnione, ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek u dzieci odwodnionych.
- Jeśli u dziecka występowało lub występuje astma lub choroby alergiczne, które mogą powodować duszność.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

**Producent**

RECKITT BENCKISER POLAND SA  
Wołoska 22  
Warszawa