

Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie, 20 kapsułek

Cena: 33,17 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NUROFEN
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki miękkie
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Nurofen Express Forte to lek działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Wskazania

Lek Nurofen Express Forte jest stosowany w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

Działanie

Lek Nurofen Express Forte ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): dawka początkowa 1 kapsułka, popijając wodą, w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.

Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).
- 1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona, Skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124), Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: Tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP, Substancje pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:

- w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku,
- jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),
- jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka I (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
- jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów),
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie,
- dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- zgaga,
- bóle brzucha,
- nudności,
- niestrawność,
- wymioty,
- wzdęcia,
- biegunka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

- owrzodzenie żołądka lub jelit,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- bezsenność,
- zaburzenia widzenia.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera barwnik czerwień koszenilową (E124), który może powodować reakcje alergiczne.
- Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy może nasilić dolegliwości
- Podczas ospy wietrznej należy unikać przyjmowania leku Nurofen Express Forte.
- Lek Nurofen Express Forte zawiera sorbitol. Osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa