

Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie, 30 kapsułek

Cena: 42,01 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NUROFEN
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	Kapsułki miękkie
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nurofen Express Forte to lek działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Wskazania

Nurofen Express Forte stosuje się w objawowym leczeniu bólu (łagodnego i umiarkowanego) takiego jak:

- ból głowy,
- bóle miesiączkowe,
- ból zębów,
- gorączka i ból związany z przeziębieniem.

Działanie

Ibuprofen zawarty w leku Nurofen Express Forte zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzęk oraz gorączkę. Należy to grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Według niektórych badań, ibuprofen może osłabiać kardioprotekcyjne działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 1 kapsułka 400 mg.

- W razie potrzeby przyjąć kolejną kapsułkę po 6h.
- Lek należy popić wodą.
- Stosować doustnie, nie rozgryzać.
- Osoby o wrażliwym żołądku powinny przyjmować lek w takcie posiłku.

- Nie przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg) w ciągu 24h.
- Jeśli po 3-4 dniach nie nastąpi poprawa należy udać się do lekarza.

Skład

- Substancją czynną jest ibuprofen (Ibuprofenum).
- Jedna kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona czerwień koszenilowa (E 124); tusz: tytanu dwutlenek (E 171) , glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:

- w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku,
- jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),
- jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli pacjent jest poważnie odwodniony.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 100):

- zaburzenia przewodu pokarmowego, np. zgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) dwunastnicy mogące w wyjątkowych przypadkach powodować niedokrwistość.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- owrzodzenie żołądka lub jelit, czasem z towarzyszącym krwawieniem i perforacją;
- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej);
- zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka);
- zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna;
- zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie;
- zaburzenia widzenia;
- reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd skóry i napady astmy.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- szumy uszne (dzwonienie w uszach),
- uszkodzenie nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

- podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolność serca;
- zapalenie przełyku lub trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita;
- podczas ospy wietrznej obserwowano poważne zakażenia skóry i tkanek miękkich;
- obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy); zapalenie nerek (zapalenie śródmiąższowe) mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek;
- zaburzenia wytwarzania komórek krwi: pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej, dolegliwości

grypopodobne, silne osłabienie, krwawienia z nosa oraz krwawienia skórne;

- reakcje psychotyczne i depresja;
- opisywano przypadki zaostrzenia stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) w wyniku stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).;
- wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca;
- zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby;
- podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgoworzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości;
- ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka z towarzyszącym zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy, utrata włosów (łysienie);
- ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości;
- zaostrzenie astmy lub skurczu oskrzeli.

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy może nasilić dolegliwości. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia takiej sytuacji, należy przerwać stosowanie leku Nurofen Express Forte i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas ospy wietrznej należy unikać przyjmowania leku Nurofen Express Forte.
- U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.
- Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach.
- Jeśli u pacjenta występują choroby serca lub tętnic obwodowych, nadciśnienie, cukrzyca, podwyższony cholesterol lub pacjent miał udar, atak serca to przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa