

Nurofen Mięśnie i Stawy, 50 mg/g, żel, 100 g

Cena: 40,71 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NUROFEN
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Nurofen Mięśnie i Stawy to przeciwzapalny żel leczniczy.

Wskazania

Miejscowe leczenie bólów pleców, bólów mięśniowych, ból towarzyszący chorobom układu mięśniowo-szkieletowego.

Działanie

Żel o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców.

Dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat: należy wycisnąć od 4 do 10 cm żelu i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia.

Skład

- Substancją czynną leku jest: ibuprofen (Ibuprofenum)
- 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nurofen Mięśnie i Stawy:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,



- jeśli u pacjenta wystąpiły uprzednio reakcje nadwrażliwości,
- nie stosować w trzecim trymestrze ciąży,
- nie stosować na uszkodzoną skórę.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- nadwrażliwość,
- ból brzucha, niestrawność,
- reakcje w miejscu podania, zmiany skórne i mrowienie w miejscu podania, nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaktyczne,
- różne wysypki, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia

- Nie wolno stosować dłużej niż 14 dni bez opinii lekarza.
- U pacjentów stosujących ibuprofen, u których występowała wcześniej astma oskrzelowa lub choroba alergiczna, może wystąpić skurcz oskrzeli.
- Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.
- Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC,
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa