

Obesimed Forte - redukcja masy ciała, 42 kapsułki



Cena: 74,77 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	42 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	AUREA PHARMA S.C.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Obesimed Forte to wyrób medyczny wspierający redukcję masy ciała. Pomaga ograniczyć uczucie głodu, stabilizuje poziom glukozy we krwi i wspomaga proces odchudzania.

Skład

Omtec19®, Amylum Solani, Omtec20®, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus, Titanium oxide (E171).

Zastosowanie

Redukcja masy ciała.

Sposób użycia

Zaleca się stosować 1-2 kapsułki 3 razy dziennie. Przyjmować należy godzinę przed posiłkiem, popijać minimum szklanką wody. Połykać w całości. Ilość stosowanych kapsułek można zwiększać stopniowo co 3 dni o jedną kapsułkę na posiłek, do momentu znaczącego zmniejszenia uczucia głodu między posiłkami. Maksymalna dawka dzienna wynosi 6 kapsułek. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 30 dni podczas jednej kuracji. Kurację można wznowić po 4 dniach przerwy. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła. Osoby chore na cukrzycę i osoby przyjmujące leki, w tym leki hipoglikemiczne powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Wyrób może spowalniać wchłanianie leków, dlatego leki doustne należy przyjmować godzinę przed zastosowaniem preparatu lub cztery godziny po jego przyjęciu. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować u dzieci.

Ostrzeżenia

- Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła.
- Osoby chore na cukrzycę i osoby przyjmujące leki, w tym leki hipoglikemiczne powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
- Wyrób może spowalniać wchłanianie leków, dlatego leki doustne należy przyjmować godzinę przed zastosowaniem preparatu

lub cztery godziny po jego przyjęciu.

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
- Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Nie stosować u dzieci.

Producent

PK Benelux BV,
Vluchtoord 17,
5406 XP Uden,
Holandia dla Aurea Pharma s.c.

Galeria

