

Octenisept Oral Mono 1 mg/ml, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 250 ml

Cena: 42,45 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	250 ml (but.)
Postać	Roztwór
Producent	SCHULKE & MAYR GMBH
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Odświeżające
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Octenisept Oral Mono 1 mg/ml to roztwór do płukania jamy ustnej, przeznaczony dla dorosłych. Ten antybakteryjny lek jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.

Wskazania

Lek Octenisept Oral Mono 1 mg/ml stosuje się u osób dorosłych:

- w celu czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej,
- w celu czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej,
- w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej.

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

Dorośli: 2 razy na dobę (po posiłku lub myciu zębów).

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: oktenidyny dwuchlorowodorku 1 mg,

Przeciwwskazania

Uczulenie na oktenidyny dwuchlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

- zaburzenia smaku, takie jak gorzki posmak,
- łagodne, odwracalne przebarwienia zębów.

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób):

- uczucie drętwienia w jamie ustnej,
- osad w jamie ustnej lub na języku,
- czasowe przebarwienie języka,
- wrażliwość zębów.

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

- ból głowy,
- nudności,
- uczucie mrowienia języka,
- zwiększone wydzielanie śliny.

Ostrzeżenia

- Lek Octenisept Oral Mono jest wskazany tylko do użytku powierzchniowego. Nie wolno podawać tego leku w głąb tkanek za pomocą strzykawki lub kaniuli aby zapobiec podrażnieniom otaczających tkanek mogącego powodować rozwój obrzęków lub martwicę tkanek. W szczególności leku nie należy stosować do płukania kieszonek przyzębnych, płukania kanałów korzeniowych lub płukania ran po zabiegach stomatologicznych.
- Nie należy połykać leku Octenisept® Oral Mono (powinien być stosowany przez pacjentów, którzy mogą samodzielnie płukać jamę ustną).
- Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami (w przypadku kontaktu leku z oczami należy je natychmiast dokładnie przemyć wodą).
- W czasie stosowania leku Octenisept® Oral Mono może wystąpić czasowe przebarwienie języka, które zanika po zaprzestaniu stosowania preparatu oraz odwracalne przebarwienie zębów.
- Octenisept Oral Mono zawiera makroglicerolu hydroksystearynian – może powodować reakcje skórne.

Producent

SCHULKE & MAYR