

Octenisept, płyn na skórę, 1000 ml



Cena: 107,97 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OCTENISEPT
Opakowanie	1 l
Postać	Płyn
Producent	SCHULKE & MAYR GMBH
Przeznaczenie	Dezynfekujące, odkażające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Octenisept to antyseptyczny aerozol do stosowania na skórę lub rany, mający na celu niszczenie drobnoustrojów i czynników zakaźnych oraz zapobieganie zakażeniom.

Wskazania

Octenisept jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku w celu: odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikutu pępowninowego); dezynfekcji jamy ustnej (np. aft, podrażnień spowodowanych noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybiczy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia mężczyzny.

Działanie

Lek Octenisept zawiera dwie substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol, które działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.
- 100 g płynu zawiera substancje czynne: Octenidinum dihydrochloridum (Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g; Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 g.
- Substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylkokosowego, sodu chlorek, woda); sodu D-glukonian; glicerol 85%; sodu wodorotlenek; woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku Octenisept, jeśli pacjent: ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie stosować leku do płukania jamy brzusznej.

Ostrzeżenia

- W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek oraz obrzęku miejscowego, nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać leku do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jamy rany (np. drenaż, odsysacz).
- Nie należy stosować leku Octenisept, do wnętrza ucha, oczu. W razie kontaktu leku z oczami, należy niezwłocznie je przepłukać dużą ilością wody.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym użyciu: 3 lata.

Producent

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2
22851 Norderstedt, Niemcy