

OeparolMed Biotyna, 10 mg, tabletki, 60 tabletek

Cena: 61,82 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

OeparolMed Biotyna to tabletki zawierające biotynę, stosowane pomocniczo w leczeniu problemów takich jak wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci oraz stany zapalne skóry wokół oczu i nosa. Jest to preparat witaminowy, dostarczający witaminę B7.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania OeparolMed Biotyna jest niedobór biotyny, objawiający się między innymi: wypadaniem włosów, zaburzeniami wzrostu włosów i paznokci, stanami zapalnymi skóry w okolicach oczu, nosa, ust i uszu.

Działanie

Lek zawiera biotynę, należącą do witamin z grupy B. OeparolMed Biotyna uzupełnia niedobory biotyny, wspomagającej tworzenie kreatyny, a także różnicowanie komórek naskórka, włosów i paznokci, poprawiając ich stan.

Dawkowanie

- Dorośli: 5 mg do 10 mg na dobę. Zwykle zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę lub, w przypadkach nasilonych objawów, 10 mg na dobę. Czas leczenia zależy od stanu pacjenta i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów po około 4 tygodniach stosowania.
- Dzieci i młodzież: U dzieci i młodzieży lek można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza. Lekarz ustali optymalne dawkowanie i czas stosowania.

Skład

- Substancją czynną leku jest Biotinum.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, typ 102; laktoza jednowodna; powidon K 30; krospowidon, typ B; magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): reakcje alergiczne (pokrzywka) zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Ostrzeżenia

- Jeśli pacjent ma być poddany badaniom laboratoryjnym, musi poinformować lekarza lub personel laboratoryjny o tym, że niedawno przyjmował lek OeparolMed Biotyna, ponieważ biotyna może zaburzać wyniki takich badań. Zaleca się przerwanie stosowania leku OeparolMed Biotyna na 3 dni przed planowanym badaniem, chyba że laboratorium wyda inne zalecenia w tym zakresie.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Galeria

